Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Matemática

O Quadrado q -Tensorial de Grupos

Ticianne Proença Bueno
Orientador: Prof. Dr. Noraí Romeu Rocco

Brasília
23/02/2006

Livros Grátis

<http://www.livrosgratis.com.br>

Milhares de livros grátis para download.

À minha mãe, Lúcia, com muito amor.

Agradecimentos

A Deus por mais esta oportunidade de crescimento .

Ao Prof. Noraí pela paciência, dedicação, orientação e principalmente pela terna amizade.

Ao meu marido, Helionei, e meus filhos, Yasmin e Victor Hugo, pelo amor e apoio que foram de fundamental importância para o término deste trabalho. Agradeço também aos meus irmãos, Thaysa, Thálita e Júnior, pela ajuda com meus filhos e pelo simples fato deles existirem. Agradeço pelo amor e força espiritual das minhas queridas avós, Grimalda e Lídia[†], ao meu pai, Estonio, e a todos os meus familiares.

Às minhas amigas Sheila, Luciana e Cira. Especialmente à Sheila e ao Adilson pelo apoio e pela força que me deram nos nossos encontros em que estudávamos álgebra. Ao André pela amizade e apoio técnico.

Aos funcionários, em especial à Tânia, e aos professores do Departamento de Matemática da UnB.

À Universidade Federal de Goiás pela oportunidade e incentivo.

Resumo

Neste trabalho estudamos o quadrado q -tensorial não-abeliano de um grupo G , $G \otimes^q G$, onde q é um inteiro não-negativo, através de sua imersão em um novo grupo, $\nu^q(G)$, aqui introduzido. Usando resultados de Brown, Ellis and Rodríguez-Fernández, estabelecemos propriedades estruturais dos grupos $\nu^q(G)$ e $G \otimes^q G$; obtemos, em certos casos, uma apresentação mais simplificada para este último grupo. Quando G é um grupo solúvel dado por uma apresentação policíclica, obtemos uma conveniente apresentação para $\nu^q(G)$, a qual oferece vantagens computacionais; uma tabela de exemplos de $\nu^q(G)$ é então exibida, para argumentos G de ordens pequenas e $q \in \{0, 2, 3, 4\}$. Em particular, descrevemos $\nu^q(G)$ completamente quando G é um grupo abeliano finito. Restringindo nossas considerações a grupos nilpotentes G , estabelecemos que $G \otimes^q G$ é nilpotente, sobre o qual G age nilpotentemente; conseqüentemente, $\nu^q(G)$ é também nilpotente. Para o caso mais específico de grupos nilpotentes de classe 2, uma apresentação bastante simplificada para $\nu^q(G)$ é obtida.

Palavras chaves: quadrado q -tensorial de grupos, extensões q -centrais de grupos, quadrado q -exterior de um grupo, q -multiplicador de Schur.

Abstract

In this thesis we study the non-abelian q -tensor square of a group G , $G \otimes^q G$, where q is a non-negative integer, through its embedding into a new group $\nu^q(G)$ here introduced. Using results of Brown, Ellis and Rodríguez-Fernández, we establish structural properties of the groups $\nu^q(G)$ and $G \otimes^q G$; in certain situations we obtain a more simplified presentation for this last group. In case G is a solvable group given by a polycyclic presentation, we obtain a convenient presentation for $\nu^q(G)$ which provides computational advantages; a table of examples of $\nu^q(G)$ is then constructed, for arguments G of small orders and $q \in \{0, 2, 3, 4\}$. In particular we completely describe $\nu^q(G)$ when G is a finite abelian group. On restricting our considerations to nilpotent groups G , we establish that $G \otimes^q G$ is nilpotent, over which G acts nilpotently; consequently $\nu^q(G)$ is nilpotent too. In the more specific case of nilpotent groups of class 2, a much simpler presentation of $\nu^q(G)$ is obtained.

Key words: q -tensor square of groups, q -central extensions of groups, q -exterior square of groups, Schur q -multiplier.

Sumário

Introdução	1
1 Preliminares	4
1.1 Identidades de Comutadores	4
1.2 Grupos Solúveis	5
1.3 Grupos Nilpotentes	6
1.4 Grupos Livres e Apresentações de Grupos	7
1.5 O Produto Tensorial Usual de Módulos	10
1.6 O Produto Tensorial Não Abelianano de Grupos	11
1.7 O q -Multiplicador de um Grupo	15
2 Uma Construção Relacionada ao Quadrado q-Tensorial	16
2.1 O Produto q -Tensorial de Grupos	16
2.2 O Grupo $\nu^q(G)$	18
3 O Quadrado q-Tensorial de um Grupo Solúvel	26
3.1 Exemplos	29
4 O Quadrado q-Tensorial de um Grupo Nilpotente	33
4.1 A Série Central Inferior de K	36
4.2 A Série Central Inferior de T	39

4.3	A Nilpotência de $G \otimes^q G$:	44
4.4	A Série Central Inferior de $\nu^q(G)$	45
4.5	A Nilpotência de $\nu^q(G)$	50
4.6	O Grupo $\nu^q(G)$ de um Grupo Nilpotente Finito	52
5	O Quadrado q-Tensorial de Grupos Nilpotentes de Classe 2 Finitamente Gerados	56
	Referências Bibliográficas	75

Introdução

O produto tensorial não-abeliano de grupos, conforme introduzido por Brown-Loday [3] encontra aplicações em homotopia e em (co)homologia não-abeliana de grupos, particularmente em questões de recobrimento. Subseqüentemente, Brown [2] introduziu uma versão, módulo um inteiro não-negativo q , desse conceito (que denominamos de produto q -tensorial de grupos) com o objetivo de relacioná-lo a extensões q -centrais universais de grupos.

Uma extensão de grupos:

$$1 \longrightarrow A \longrightarrow E \longrightarrow G \longrightarrow 1$$

é dita q -central, onde q é um inteiro não-negativo, se A é um subgrupo central de E e todo elemento de A tem ordem dividindo q .

Uma tal extensão q -central é dita q -central universal se para qualquer outra extensão q -central:

$$1 \longrightarrow A' \longrightarrow E' \longrightarrow G \longrightarrow 1$$

existe um único morfismo de extensões:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

Um dos resultados principais de Brown em [2] assegura que uma extensão q -central é universal se, e somente se, G é q -perfeito (isto é, gerado por comutadores $[g_1, g_2]$ e potências q -ésimas g^q , para $g_1, g_2, g \in G$) e E é isomorfo ao

quadrado q -exterior $G \wedge^q G$. Um resultado análogo ao de Brown foi obtido por Conduché e Rodríguez-Fernández, em [3], para o caso de extensões centrais relativas. Neste sentido eles estabeleceram vários resultados envolvendo o produto q -tensorial $M \otimes^q N$, e o produto q -exterior $G \wedge^q G$, de dois G -módulos cruzados M e N .

Ellis em [6] observou que extensões q -centrais universais naturalmente se generalizam para G -módulos q -cruzados projetivos e que estes são determinados, a menos de uma extensão de grupos, por um quadrado q -exterior e um $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ -módulo projetivo. Neste mesmo artigo ele estuda a estrutura de quadrados q -exteriores através de uma construção mais geral, o produto q -tensorial, $M \otimes^q N$, quando M e N subgrupos normais de G .

Esta tese tem como enfoque principal o quadrado q -tensorial de um grupo G , denotado por $G \otimes^q G$, via uma construção relacionada, $\nu^q(G)$, aqui introduzida. Este estudo foi motivado pelos trabalhos citados anteriormente, particularmente pela abordagem apresentada por Ellis em [6], bem como por resultados de Rocco em [20] e [21], aqui generalizados.

Estabelecemos propriedades estruturais dos grupos $\nu^q(G)$ e $G \otimes^q G$, obtendo em certos casos uma apresentação mais simplificada, o que apresenta vantagens computacionais na manipulação destes grupos. Isto é desejável uma vez que as relações de $\nu^q(G)$ e conseqüentemente de $G \otimes^q G$, crescem rapidamente conforme aumenta a ordem de G .

No Capítulo 1 introduzimos todos os conceitos e notações necessárias ao desenvolvimento subsequente do nosso trabalho.

No Capítulo 2 começamos com o quadrado q -tensorial de um grupo G , $G \otimes^q G$ e algumas de suas propriedades. Motivados pelo grupo $\nu(G)$, introduzido por Rocco em [2], e pelo isomorfismo do Teorema 8, [6], introduzimos um novo grupo relacionado a $G \otimes^q G$ e denotado por $\nu^q(G)$. Vimos algumas propriedades de $\nu^q(G)$ e construímos um diagrama com alguns de seus subgrupos.

No Capítulo 3 restringimos nossa atenção à classe dos grupos solúveis e obtemos uma proposição que facilita bastante os cálculos para determinarmos o grupo $\nu^q(G)$, produzindo assim uma tabela de exemplos. No final, consideramos os grupos abelianos.

No Capítulo 4 trabalhamos com o quadrado q -tensorial de grupos nilpotentes. Obtivemos propriedades sobre as séries centrais inferiores dos grupos K e T , concluindo assim sobre a nilpotência de $G \otimes^q G$. Como resultado principal do nosso trabalho obtivemos o Teorema 4.21 que garante a nilpotência de $\nu^q(G)$. Ainda neste capítulo trabalhamos com o quadrado q -tensorial de grupos nilpotentes finitos, obtendo resultados mais gerais que aqueles obtidos em [20] para o caso $q = 0$.

No Capítulo 5 apresentamos uma proposição que determina uma outra apresentação para $\nu^q(G)$, denotada por $\delta^q(G)$, que tem um número menor de relações, para grupos G nilpotentes de classe dois e finitamente gerados.

Capítulo 1

Preliminares

Neste capítulo introduziremos os conceitos e principais propriedades da teoria de grupos finitos que são necessários para o desenvolvimento dos capítulos seguintes.

1.1 Identidades de Comutadores

Sejam $g_1, g_2, \dots, g_n$ elementos de um grupo G .

O conjugado de g_1 por g_2 é dado por:

$$g_1^{g_2} = g_2^{-1}g_1g_2. \quad (1.1)$$

O comutador de g_1 e g_2 é dado por:

$$[g_1, g_2] = g_1^{-1}g_1^{g_2}. \quad (1.2)$$

O comutador de peso n , para $n \geq 2$, é definido por:

$$[g_1, g_2, \dots, g_n] = [[g_1, \dots, g_{n-1}], g_n]. \quad (1.3)$$

Valem as seguintes propriedades:

(i) $[g_1, g_2] = [g_1, g_2^{-1}]^{-g_2} = [g_1^{-1}, g_2]^{-g_1}$;

- (ii) $[g_1 g_2, g_3] = [g_1, g_3]^{g_2} [g_2, g_3] = [g_1, g_3] [g_1, g_3, g_2] [g_2, g_3];$
 (iii) $[g_1, g_2 g_3] = [g_1, g_3] [g_1, g_2]^{g_3} = [g_1, g_3] [g_1, g_2] [g_1, g_2, g_3];$
 (iv) $[g_1, g_2^{-1}, g_3]^{g_2} [g_2, g_3^{-1}, g_1]^{g_3} [g_3, g_1^{-1}, g_2]^{g_1} = 1.$

Sejam G um grupo e X um subconjunto não vazio de G , denotamos por $\langle X \rangle$, o subgrupo de G gerado por X . Se $X = \{a_1, \dots, a_n\}$ então escrevemos simplesmente $G = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$.

Sejam H e K subgrupos do grupo G , denotamos por $[H, K]$ o subgrupo de G gerado pelo conjunto de todos os comutadores $[h, k]$, com $h \in H$ e $k \in K$.

Se $H_1, H_2, \dots, H_n$ são subgrupos de G , definimos:

$$[H_1, H_2, \dots, H_n] = [[H_1, \dots, H_{n-1}], H_n]. \quad (1.4)$$

Proposição 1.1 *Sejam H, K e L subgrupos de um grupo G , com $H \trianglelefteq G$. Então $[HK, HL] \leq H[K, L]$.*

1.2 Grupos Solúveis

Definição 1.1 *Uma série subnormal de um grupo G é uma sequência finita de subgrupos de G :*

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \dots \geq G_n = 1 \quad (1.5)$$

na qual $G_i \triangleleft G_{i-1}$, $\forall i = 1, \dots, n$. Os grupos quocientes G_{i-1}/G_i , $1 \leq i \leq n$, são denominados fatores da série.

Definição 1.2 *Um grupo G é solúvel se este tem uma série subnormal cujos fatores são abelianos.*

Seja G um grupo finito solúvel cuja série subnormal (1.5) tem fatores G_{i-1}/G_i de ordem r_i , $1 \leq i \leq n$. Isto significa que $G_{i-1} = \langle a_i, \dots, a_n \rangle$ e $a_i^{r_i} \in G_i =$

$\langle a_{i+1}, \dots, a_n \rangle$. A seqüência $(a_1, \dots, a_n)$ é chamada de AG-sistema de geradores para G , com as seguintes relações definidoras:

$$a_i^{r_i} = w_{ii'}(a_{i+1}, \dots, a_n), 1 \leq i \leq n; \quad (1.6)$$

$$a_i^{a_j} = w_{ij'}(a_{j+1}, \dots, a_n), 1 \leq i \leq n; \quad (1.7)$$

que são chamadas de relações-potências e relações-conjugados, respectivamente.

As relações-conjugados podem ser reescritas coletando os geradores a_i , $1 \leq i \leq n$, em ordem decrescente da esquerda para a direita. Portanto, para o dado AG-sistema, as relações são:

$$\text{G-relações : } \begin{cases} a_i^{r_i} = w_{ii'}(a_n, \dots, a_{i+1}), & 1 \leq i \leq n; \\ a_i^{a_j} = w_{ij'}(a_n, \dots, a_{j+1}), & 1 \leq j < i \leq n. \end{cases}$$

Daí segue que todo elemento $g \in G$ tem uma expressão na forma normal

$$g = a_n^{\nu_n} a_{n-1}^{\nu_{n-1}} \dots a_1^{\nu_1}, \quad (1.8)$$

onde $0 \leq \nu_i \leq r_i$, $1 \leq i \leq n$.

1.3 Grupos Nilpotentes

Definimos a série central inferior de um grupo G como sendo a série:

$$G = \gamma_1(G) \geq \gamma_2(G) \geq \dots \quad (1.9)$$

na qual $\gamma_{n+1}(G) = [\gamma_n(G), G]$.

Notamos que, $\gamma_n(G)/\gamma_{n+1}(G) \leq Z(G/\gamma_{n+1}(G))$ e que cada $\gamma_n(G)$ é totalmente invariante em G .

Quando $\gamma_c(G) \neq \gamma_{c+1}(G) = 1$, dizemos que G é nilpotente de classe c , cuja notação é $cl(G) = c$.

A seguir relacionamos alguns resultados básicos sobre grupos nilpotentes, cujas demonstrações podem ser encontradas em [24].

Proposição 1.2 *A classe dos grupos nilpotentes é fechada a subgrupos, quocientes e a produtos diretos de um número finito de grupos.*

Teorema 1.1 (Fitting) *Sejam H e K subgrupos normais de um grupo G e suponhamos que H e K sejam nilpotentes de classes c e d , respectivamente. Então HK é nilpotente de classe no máximo $c + d$.*

Teorema 1.2 *Seja G um grupo finito. G é nilpotente se, e somente se, G é o produto direto de seus subgrupos de Sylow.*

Lema 1.1 *Seja G um grupo nilpotente de classe 2. Então para quaisquer $a, b \in G$ e todo $n \in \mathbb{Z}$,*

$$[a, b^n] = [a^n, b] = [a, b]^n, \quad (ab)^n = a^n b^n [b, a]^{\binom{n}{2}}. \quad (1.10)$$

Conseqüentemente, se G é um grupo nilpotente de classe 2 n -gerado pelo conjunto $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, então pelo processo de coleta [e.g. 3], um elemento qualquer $g \in G$ pode ser escrito da forma:

$$g = \prod_{i=1}^n x_i^{m_i} \cdot \prod_{1 \leq j < k \leq n} [x_j, x_k]^{l_{jk}} \quad (1.11)$$

onde $m_i, l_{jk} \in \mathbb{Z}$.

Para $g \in G$, $h \in H$ coloque $[g, {}_0 h] = g^{-1}, [g, {}_1 h] = g^{-1} g^h$ e, para $i \geq 1$, $[g, {}_{(i+1)} h] := [[g, {}_i h], h]$, (cf.[18]).

Definição 1.3 *Dizemos que a ação de H em G é (direita) nilpotente de classe c se $[G, {}_c H] = \{1\}$ e $[G, {}_{c-1} H] \neq 1$.*

Em particular, se $G = H$ e a ação é conjugação em G então a ação (direita) nilpotente de classe c coincide com a classe c de nilpotência de G .

1.4 Grupos Livres e Apresentações de Grupos

Os resultados a seguir podem ser encontrados em [11] e [13].

Definição 1.4 Um grupo F é dito livre sobre um subconjunto $X \subseteq F$ se, para qualquer grupo G e $\theta : X \rightarrow G$, existe um único homomorfismo $\theta' : F \rightarrow G$ tal que $\theta'(x) = \theta(x)$, para todo $x \in X$.

A cardinalidade de X é chamada de posto de F .

Observação 1.1 Se escrevermos "grupo abeliano" no lugar da palavra "grupo" na definição acima obtemos a definição de grupo abeliano livre.

Teorema 1.3 Um grupo abeliano livre de posto r é a soma direta de r grupos cíclicos infinitos.

Sejam X um conjunto, $F = F(X)$ o grupo livre sobre X , R um subconjunto de F , N o fecho normal de R em F que denotamos por $\langle R \rangle^F = N$ e G o grupo quociente F/N .

Definição 1.5 Com esta notação escrevemos $G = \langle X|R \rangle$, e dizemos que esta é uma apresentação de G . Os elementos de X são chamados de geradores, e os elementos de R de relatores. Um grupo G é dito finitamente apresentado se este tem uma tal apresentação com X e R finitos.

Observação 1.2 Para cada $r \in R$, a equação $r = 1$ é chamada de relação definidora de G .

Teorema 1.4 Todo grupo tem uma apresentação, e todo grupo finito tem uma apresentação finita.

Teorema 1.5 (Teste da Substituição) Suponha que são dados uma apresentação $G = \langle X|R \rangle$, um grupo H e uma função $\theta : X \rightarrow H$. Então θ se estende a um homomorfismo $\theta' : G \rightarrow H$ se, e somente se, para todos $x \in X$ e $r \in R$, o resultado da substituição de x por $\theta(x)$ em r dá a identidade de H .

Teorema 1.6 Sejam $G = \langle X|R \rangle$ e $H = \langle Y|S \rangle$ duas apresentações; então o produto direto $G \times H$ tem a apresentação:

$$\langle X, Y | R, S, [X, Y] \rangle.$$

Definição 1.6 Se $G = \langle X|R \rangle$ e $H = \langle Y|S \rangle$ então o grupo $\langle X, Y|R, S \rangle$ é chamado de produto livre de G e H , e é denotado por $G * H$.

Proposição 1.3 Seja $G * H$ o produto livre dos grupos G e H . O subgrupo comutador $[G, H]$ de $G * H$ é normal. Além disso, $[G, H]$ é um grupo livre sobre o conjunto $\{[g, h] | g \in G, h \in H, g, h \neq 1\}$.

Proposição 1.4 Se G, H e K são grupos e $\alpha : G \rightarrow H, \beta : G \rightarrow K$ são homomorfismos com α sobrejetora e tais que $Nuc(\alpha) \subseteq Nuc(\beta)$ então existe um homomorfismo $\gamma : H \rightarrow K$ tal que $\alpha\gamma = \beta$.

Uma palavra no grupo $G = \langle F|R \rangle$ onde F é o grupo livre sobre $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ é uma seqüência finita $w = x_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_j}, j \geq 0$.

Definição 1.7 (Transformações de Tietze) Consideremos o grupo G com a apresentação:

$$G = \langle a, b, c, \dots | P, Q, R, \dots \rangle. \tag{1.12}$$

As seguintes operações com os geradores e relatores de G são chamadas de transformações de Tietze:

- (T1) Se as palavras $S, T, \dots$ são deriváveis de $P, Q, R, \dots$ então adicionamos $S, T, \dots$ nas relações definidoras em (1.12);
- (T2) Se alguns dos relatores, digamos $S, T, \dots$ listados nas relações definidoras $P, Q, R, \dots$ são deriváveis de outras, então delete $S, T, \dots$ das relações definidoras em (1.12);
- (T3) Se $K, M, \dots$ são quaisquer palavras em $a, b, c, \dots$ então adjunte os símbolos

$x, y, \dots$ aos geradores em (1.12) e adjunte as relações $x = K, y = M, \dots$ às relações definidoras;

(T4) Se alguma das relações definidoras em (1.12) é da forma $p = V, q = W, \dots$, onde $p, q, \dots$ são geradores e $V, W, \dots$ são palavras nos geradores fora de $p, q, \dots$ então delete $p, q, \dots$ dos geradores e troque $p, q, \dots$ por V, W , nas relações definidoras e delete $p = V, q = W, \dots$ das relações definidoras;

H. Tietze mostrou que dada uma apresentação $G = \langle a, b, c, \dots | P, Q, R, \dots \rangle$ para um grupo G , qualquer outra apresentação de G pode ser obtida por repetidas aplicações de T_1, T_2, T_3 e T_4 .

1.5 O Produto Tensorial Usual de Módulos

Consideraremos R um anel com identidade e .

Definição 1.8 Um grupo abeliano (aditivo) M é um R -módulo à esquerda se existe uma função $R \times M \rightarrow M$, onde $(r, m) \mapsto rm$, tal que:

- (i) $r(m + m') = rm + rm'$;
- (ii) $(r + r')m = rm + r'm$;
- (iii) $(rr')m = r(r'm)$;
- (iv) $em = m$;

para todo $m, m' \in M, r, r' \in R$.

Desta mesma maneira definimos um R -módulo à direita. Se R é também comutativo, todo R -módulo à direita M pode ser considerado um R -módulo à esquerda definindo $rm = mr, \forall m \in M, r \in R$.

Definição 1.9 Se M é um R -módulo à direita, N um R -módulo à esquerda e G um grupo abeliano aditivo então uma função R -biaditiva é uma aplicação $f : M \times N \rightarrow G$ tal que:

- (i) $f(m + m', n) = f(m, n) + f(m', n)$;
- (ii) $f(m, n + n') = f(m, n) + f(m, n')$;

- (iii) $f(mr, n) = f(m, rn)$;
para todo $m, m' \in M$, $n, n' \in N$ e $r \in R$.

Sejam M um R -módulo à direita e N um R -módulo à esquerda. Definimos um produto tensorial de M e N da seguinte forma:

Definição 1.10 Um produto tensorial de M e N , denotado por $M \otimes_{\mathbb{Z}} N$, é um grupo abeliano T junto com uma função R -biaditiva φ tais que, para todo grupo abeliano G e toda função R -biaditiva $f : M \times N \rightarrow G$, existe um único homomorfismo $\tilde{f} : T \rightarrow G$ tal que o seguinte diagrama é comutativo.

$$\begin{array}{ccc}
 M \times N & \xrightarrow{\varphi} & T \\
 \downarrow f & & \swarrow \tilde{f} \\
 G & &
 \end{array}$$

Proposição 1.5 (cf. [16]) Se M e N são grupos abelianos finitamente gerados com M ou N finito então $M \otimes_{\mathbb{Z}} N$ é finito.

Proposição 1.6 (cf. [16]) Se p e q são números primos entre si então $\mathbb{Z}_p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_q$ é o grupo trivial, onde $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

1.6 O Produto Tensorial Não Abelianiano de Grupos

O produto tensorial não-abeliano dos grupos G e H , denotado por $G \otimes H$, introduzido por Brown e Loday (cf. [3]), generaliza o produto tensorial usual $G/G' \otimes_{\mathbb{Z}} H/H'$ dos grupos abelianizados, sob a hipótese de que G e H agem um sobre o outro.

Mais especificamente, dados os grupos G e H um agindo sobre o outro, à direita,

$$\begin{aligned} G \times H &\rightarrow G & H \times G &\rightarrow H \\ (g, h) &\mapsto g^h & (h, g) &\mapsto h^g \end{aligned}$$

de maneira que para $g, g_1 \in G$ e $h, h_1 \in H$,

$$g^{hg_1} = g^{g_1^{-1}hg_1}, \quad h^{gh_1} = h^{h_1^{-1}gh_1} \quad (1.13)$$

onde G e H agem neles mesmos por conjugação, então o produto tensorial não-abeliano $G \otimes H$ é definido como o grupo gerado pelos símbolos $g \otimes h$, $g \in G$ e $h \in H$, sujeito às relações:

$$gg_1 \otimes h = (g^{g_1} \otimes h^{g_1})(g_1 \otimes h)$$

$$g \otimes hh_1 = (g \otimes h_1)(g^{h_1} \otimes h^{h_1})$$

para todo $g, g_1 \in G$, $h, h_1 \in H$.

Quando G e H atuam um sobre o outro e satisfazem (1.13) dizemos que as ações são compatíveis.

Uma vez que a ação por conjugação de um grupo G sobre si mesmo satisfaz (1.13), o quadrado tensorial não-abeliano de um grupo G , $G \otimes G$, pode sempre ser definido.

Se G e H são subgrupos normais de um grupo E podemos considerar a ação de um subgrupo sobre o outro dada pela ação do grupo maior, E , sobre eles.

Buscando dar um tratamento grupo-teorético ao estudo sobre o quadrado tensorial não-abeliano de grupos e valendo-se do cálculo de comutadores, *Rocco* (cf. [20]), introduziu um operador ν na classe dos grupos, definido a seguir.

Sejam G um grupo arbitrário, G^φ isomorfo a G através do isomorfismo $\varphi : g \mapsto g^\varphi, \forall g \in G$. Define-se o grupo $\nu(G)$, em [20],

$$\nu(G) := \langle G, G^\varphi \mid [g_1, g_2^\varphi]^{g_3} = [g_1^{g_3}, (g_2^{g_3})^\varphi] = [g_1, g_2^\varphi]^{g_3^\varphi}, \forall g_1, g_2, g_3 \in G \rangle.$$

Consideremos o seguinte subgrupo de $\nu(G)$:

$$\Upsilon(G) = [G, G^\varphi].$$

A relação entre $\nu(G)$ e $G \otimes G$ é dada pelo seguinte resultado:

Proposição 1.7 [21] $\Upsilon(G) \cong G \otimes G$, através do isomorfismo $g \otimes h \mapsto [g, h^\varphi]$, $\forall g, h \in G$.

Proposição 1.8 [21] Vale o isomorfismo:

$$\nu(G) \cong (\Upsilon(G) \rtimes G) \rtimes G^\varphi.$$

Lema 1.2 [20] As seguintes relações valem em $\nu(G)$:

- (i) $[g_1, g_2^\varphi]^{[g_3, g_4^\varphi]} = [g_1, g_2^\varphi]^{[g_3, g_4]}$;
- (ii) $[g_1, g_2^\varphi, g_3] = [g_1, g_2, g_3^\varphi] = [g_1, g_2^\varphi, g_3^\varphi] = [g_1^\varphi, g_2, g_3] = [g_1^\varphi, g_2, g_3^\varphi] = [g_1^\varphi, g_2^\varphi, g_3]$;
- (iii) $[g_1, g_1^\varphi]$ é central em $\nu(G)$;
- (iv) $[g, g^\varphi] = 1, \forall g \in G'$;

para todo $g_1, g_2, g_3, g_4 \in G$.

Lema 1.3 [21] Sejam x, y elementos de G tais que $[x, y] = 1$. Então:

- (i) $[x^n, y^\varphi] = [x, y^\varphi]^n = [x, (y^\varphi)^n], \forall n \in \mathbb{Z}$;
- (ii) Se x e y são elementos de torção de ordens $o(x)$ e $o(y)$, então $o([x, y^\varphi])$ divide $\text{mdc}(o(x), o(y))$.

Teorema 1.7 [21] Sejam G e G^φ grupos isomorfos finitos solúveis e distintos dados pelos AG -sistemas $\{a_1, \dots, a_n\}$ e $\{b_1, \dots, b_n\}$ respectivamente. Então,

$$\delta(G) := \langle a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n | G - \text{rel.}, G^\varphi - \text{rel.}, [a_i, b_j]^{a_k} = [a_i^{a_k}, b_j^{b_k}] = [a_i, b_j]^{b_k}, 1 \leq i, j, k \leq n \rangle,$$

é uma apresentação de $\nu(G)$.

Teorema 1.8 [7] Se G e H são grupos finitos então $G \otimes H$ finito. Se além disso, G e H são p -grupos então $G \otimes H$ também é.

Definição 1.11 Um módulo cruzado é um homomorfismo de grupos $\mu : M \rightarrow P$ junto com uma ação de P sobre M satisfazendo as seguintes condições:

- (i) $\mu(m^p) = p^{-1}\mu(m)p, \forall p \in P, m \in M;$
- (ii) $m_1^{\mu(m)} = m^{-1}m_1m, \forall m, m_1 \in M.$

Proposição 1.9 [4]

- (i) *Existem homomorfismos de grupos $\lambda : G \otimes H \rightarrow G, \mu : G \otimes H \rightarrow H$ tais que:*

$$\lambda(g \otimes h) = g^{-1}g^h$$

$$\mu(g \otimes h) = h^{-g}h;$$

- (ii) *os homomorfismos λ, μ com as ações de G e H em $G \otimes H$ dadas por:*

$$(g_1 \otimes h)^g = g_1^g \otimes h^g$$

$$(g \otimes h_1)^h = g^h \otimes h_1^h$$

para $g, g_1 \in G$ e $h, h_1 \in H$, são módulos cruzados.

De acordo com o isomorfismo da Proposição (1.7), podemos reformular o resultado de Bacon em [4], da seguinte maneira:

Proposição 1.10 [20] *Para todo $g, g_1 \in G$ e $h, h_1 \in H$ temos:*

- (i) $[g^{-1}, h^\varphi]^g = [g, h^\varphi]^{-1} = [g, (h^{-1})^\varphi]^h;$
- (ii) $[g, h^\varphi]^{-1}[g_1, h_1^\varphi][g, h^\varphi] = [g_1, h_1^\varphi]^{[g, h]} = [g_1, h_1^\varphi]^{g^{-1}g^h} = [g_1, h_1^\varphi]^{h^{-g}h};$
- (iii) $[g^{-1}g^h, h_1^\varphi] = [g, h^\varphi]^{-1}[g, h^\varphi]^{h_1};$
- (iv) $[g_1, (h^{-g}h)^\varphi] = [g, h^\varphi]^{-g_1}[g, h^\varphi];$
- (v) $[[g, h^\varphi], [g_1, h_1^\varphi]] = [g^{-1}g^h, (h_1^{-g_1}h_1)^\varphi].$

Lema 1.4 [1] *Seja G um grupo nilpotente de classe 2. Então para quaisquer $x, y \in G$ e quaisquer inteiros m, n*

$$[x^n, (y^n)^\varphi] = [x, y^\varphi]^{nm} [y, [x, y]^\varphi]^{n \binom{m}{2}} [x, [x, y]^\varphi]^{m \binom{n}{2}}. \quad (1.14)$$

Observação 1.3 *Deste resultado segue que se G é nilpotente de classe 2 com $x \in G$ e $y \in G'$ então $x^n \otimes y^n = (x \otimes y)^n$.*

Nakaoka (cf. [17]) introduziu o operador η que generaliza o operador ν para o caso de dois grupos G e H que agem um sobre o outro de maneira compatível. Considerando H^φ uma cópia de H , onde $\varphi : h \mapsto h^\varphi, \forall h \in H$, então:

$$\eta(G, H) = \langle G, H^\varphi \mid [g, h^\varphi]^{g_1} = [g^{g_1}, (h^{g_1})^\varphi] = [g, h^\varphi]^{g_1^\varphi}, \forall g, g_1 \in G, \forall h \in H \rangle.$$

Observamos que se $G = H$ e a ação é a conjugação, então $\eta(G, H) = \nu(G)$.

Nesta situação mais geral valem resultados semelhantes aos das Proposições (1.7) e (1.8), quais sejam:

Proposição 1.11 [16]

- (i) $[G, H^\varphi] \cong G \otimes H$;
- (ii) $\eta(G, H) \cong ([G, H^\varphi] \rtimes G) \rtimes H$.

1.7 O q -Multiplicador de um Grupo

Seja $H_2(G, \mathbb{Z}_q)$ o segundo grupo de homologia do grupo G com coeficientes em $\mathbb{Z}_q$, onde q é um inteiro não negativo. A fórmula de Hopf para o segundo grupo de homologia inteiro $H_2(G, \mathbb{Z})$ (cf. [15]), junto com a seqüência exata curta dos coeficientes:

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\times q} \mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}_q \tag{1.15}$$

nos dá a fórmula:

$$H_2(G, \mathbb{Z}_q) \cong R \cap F'F^q / R^q[R, F] \tag{1.16}$$

onde $R \twoheadrightarrow F \twoheadrightarrow G$ é uma apresentação livre qualquer de G .

Definição 1.12 *Definimos o q -multiplicador de um grupo G como o grupo quociente $R/R^q[R, F]$, e denotamos por $M^q(G)$.*

Capítulo 2

Uma Construção Relacionada ao Quadrado q -Tensorial

Neste capítulo apresentamos o conceito de produto q -tensorial de grupos G e H (cf. [6]) através de sua apresentação, e introduzimos um novo grupo denotado por $\nu^q(G)$, estabelecendo algumas propriedades destes grupos. O Diagrama 1 exhibe aspectos estruturais de $\nu^q(G)$ contemplando alguns de seus principais subgrupos.

2.1 O Produto q -Tensorial de Grupos

Sejam G e H dois subgrupos normais de um grupo E . Seguindo *Ellis*, definimos o produto q -tensorial de G e H , $G \otimes^q H$, para $q \geq 1$, como o grupo gerado pelos símbolos $g \otimes h$ e $\{k\}$ para $g \in G$, $h \in H$, $k \in G \cap H$, sujeito às seguintes relações para $g, g_1 \in G$, $h, h_1 \in H$ e $k, k' \in G \cap H$:

$$g \otimes hh_1 = (g \otimes h_1)(g^{h_1} \otimes h^{h_1}) \quad (2.1)$$

$$gg_1 \otimes h = (g^{g_1} \otimes h^{g_1})(g_1 \otimes h) \quad (2.2)$$

$$(g \otimes h)^{\{k\}} = g^{k^q} \otimes h^{k^q} \quad (2.3)$$

$$\{kk'\} = \{k\} \prod_{i=1}^{q-1} (k^{-1} \otimes (k'^i k^{1-q+i})) \{k'\} \quad (2.4)$$

$$[\{k\}, \{k'\}] = k^q \otimes k'^q \quad (2.5)$$

$$\{[g, h]\} = (g \otimes h)^q. \quad (2.6)$$

Para $q = 0$, seguimos [3] e definimos o produto 0-tensorial $G \otimes^0 H$ como o grupo gerado pelos símbolos $g \otimes h$, para $g \in G$, $h \in H$ sujeito às relações (2.1) e (2.2), ou seja, como o produto tensorial não-abeliano $G \otimes H$.

Observação 2.4 *As relações (2.1) e (2.2) são relações de comutadores em grupos, e as relações (2.3) a (2.6) podem ser vistas como abstrações das identidades que aparecem em apresentações por potências e comutadores (P.C.P.).*

Definição 2.13 *O produto q-exterior de G e H , denotado por $G \wedge^q H$, é definido como o quociente de $G \otimes^q H$ pelo subgrupo normal gerado pelos elementos da forma $k \otimes k$, onde $k \in G \cap H$.*

Teorema 2.9 [5] *Sejam G e H subgrupos normais de um grupo E , e $q \geq 0$, então:*

(i) *O homomorfismo:*

$$\begin{aligned} \partial : G \otimes^q H &\longrightarrow G \\ g \otimes h &\longmapsto [g, h] \\ \{k\} &\longmapsto k^q \end{aligned}$$

é um E -módulo q-cruzado com E -ação dada por:

$$\begin{cases} (g \otimes h)^x = g^x \otimes h^x \\ \{k\}^x = \{k^x\} \end{cases}$$

(ii) *Para $r \geq 1$ existe uma sequência exata: $G \otimes^{qr} H \xrightarrow{\phi} G \otimes^r H \longrightarrow G \cap H / G \sharp^q H \longrightarrow 1$ onde, $G \sharp^q H$ denota o subgrupo de E gerado pelos comutadores $[g, h]$ e pelas q-ésimas potências x^q para $g \in G$, $h \in H$ e $x \in G \cap H$ e o homomorfismo ϕ é definido por:*

$$\begin{aligned} \phi : g \otimes h &\longmapsto g \otimes h \\ \{k\} &\longmapsto \{k^q\} \end{aligned}$$

(iii) Se $G \cap H = G \sharp^q H$, então $G \otimes^q H \cong G \wedge^q H$;

(iv) Se $[G, H] = 1$, então $G \otimes^q H \cong (G/G \sharp^q G) \otimes_{\mathbb{Z}} (H/H \sharp^q H)$

Neste e nos demais capítulos deste trabalho nos dedicamos ao estudo de uma construção relacionada ao quadrado q -tensorial de um dado grupo G , $G \otimes^q G$, fazendo o uso de técnicas grupo-teoréticas.

2.2 O Grupo $\nu^q(G)$

Sejam G e G^φ grupos isomorfos através do isomorfismo $\varphi : g \mapsto g^\varphi$, $\forall g \in G$ e $\mathcal{K} = \{\{k\} | k \in G\}$ um conjunto de símbolos, um para cada elemento de G (para $q = 0$ seja $\mathcal{K}$ o conjunto vazio). Seja $F(\mathcal{K})$ o grupo livre sobre $\mathcal{K}$ e seja $\nu(G) * F(\mathcal{K})$ o produto livre do grupo $\nu(G)$ com $F(\mathcal{K})$, onde $\nu(G)$ é o grupo definido no Capítulo 1 (cf. [21]).

De acordo com a estrutura de $\nu(G)$ temos que G e G^φ estão imersos no produto livre $\nu(G) * F(\mathcal{K})$. Sendo assim, identificaremos os elementos de G (respectivamente G^φ) com suas respectivas imagens em $\nu(G) * F(\mathcal{K})$. Consideremos J o fecho normal em $\nu(G) * F(\mathcal{K})$ dos elementos:

$$g_1^{-1} \{k\} g_1 \{k^{g_1}\}^{-1} \quad (2.7)$$

$$(g_2^\varphi)^{-1} \{k\} (g_2^\varphi) \{k^{g_2}\}^{-1} \quad (2.8)$$

$$\{k\}^{-1} [g_1, g_2^\varphi] \{k\} [g_1^{k^q}, (g_2^{k^q})^\varphi]^{-1} \quad (2.9)$$

$$\{kk'\} \{k'\}^{-1} \prod_{i=1}^{q-1} [k^{-1}, (k'^{i k^{1-q+i}})^\varphi]^{-1} \{k\}^{-1} \quad (2.10)$$

$$[\{k\}, \{k'\}] [k^q, (k'^q)^\varphi]^{-1} \quad (2.11)$$

$$\{[g_1, g_2^\varphi]\} [g_1, g_2^\varphi]^{-q} \quad (2.12)$$

para $\{k\}, \{k'\} \in \mathcal{K}, g_1 \in G$ e $g_2^\varphi \in G^\varphi$.

Vamos indicar por $\nu^q(G)$ o grupo $(\nu(G) * F(\mathcal{K}))/J$.

Observação 2.5 *Note que para $q = 0$ os conjuntos de relações (2.7) a (2.12) também são vazios e, conseqüentemente, $\nu(G) * F(\mathcal{K})/J \cong \nu(G)$.*

Portanto o grupo $\nu^q(G)$ tem a seguinte apresentação: $\nu^q(G) = \langle G, G^\varphi, \mathcal{K} \mid S, R \rangle$, com $S = \{S_1, S_2\}$, que são as relações definidoras de $\nu(G)$, e $R = \{R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6\}$, onde:

$$S_1 : [g_1^{g_3}, (g_2^{g_3})^\varphi] = [g_1, g_2^\varphi]^{g_3} \quad (2.13)$$

$$S_2 : [g_1^{g_3}, (g_2^{g_3})^\varphi] = [g_1, g_2^\varphi]^{g_3^\varphi} \quad (2.14)$$

$$R_1 : \{k\}^{g_1} = \{k^{g_1}\} \quad (2.15)$$

$$R_2 : \{k\}^{g_2^\varphi} = \{k^{g_2}\} \quad (2.16)$$

$$R_3 : [g_1, g_2^\varphi]^{\{k\}} = [g_1^{k^q}, (g_2^{k^q})^\varphi] \quad (2.17)$$

$$R_4 : \{kk'\} = \{k\} \prod_{i=1}^{q-1} [k^{-1}, (k'^i k^{1-q+i})^\varphi] \{k'\} \quad (2.18)$$

$$R_5 : [\{k\}, \{k'\}] = [k^q, (k'^q)^\varphi] \quad (2.19)$$

$$R_6 : \{[g_1, g_2]\} = [g_1, g_2^\varphi]^q \quad (2.20)$$

para $g_1, g_2, g_3 \in G$ e $\forall \{k\}, \{k'\} \in \mathcal{K}$.

Observação 2.6 *Pelo conjunto de relações R_3 temos que o subgrupo de $\nu^q(G)$ gerado por $\mathcal{K}$, $\langle \mathcal{K} \rangle$, normaliza o comutador $[G, G^\varphi]$ em $\nu^q(G)$. Denotaremos por $\Upsilon^q(G)$ o subgrupo normal de $\nu^q(G)$: $[G, G^\varphi].\langle \mathcal{K} \rangle$.*

Nosso primeiro resultado relacionando $\nu^q(G)$ ao quadrado q-tensorial, $G \otimes^q G$, generaliza um resultado de Rocco (cf. Proposição 1.7).

Teorema 2.10 *Vale o isomorfismo:*

$$\Upsilon^q(G) \cong G \otimes^q G. \quad (2.21)$$

Demonstração:

Primeiro consideremos $[G, G^\varphi] \langle \mathcal{K} \rangle$ como subgrupo de $(G * G^\varphi) \langle \mathcal{K} \rangle$, notamos que $[G, G^\varphi]$ é um subgrupo normal de $(G * G^\varphi)$.

Observemos que $[G, G^\varphi] \langle \mathcal{K} \rangle$ admite ações de G , G^φ e K dadas pelas relações definidoras de $\nu^q(G)$. As seguintes propriedades valem em $[G, G^\varphi] \langle \mathcal{K} \rangle$:

$$[g_1, g_2^\varphi]^g = [g_1 g, g_2^\varphi][g_1, g_2^\varphi]^{-1} \quad (2.22)$$

$$[g_1, g_2^\varphi]^{g^\varphi} = [g_1, g^\varphi]^{-1}[g_1, (g_2 g)^\varphi]. \quad (2.23)$$

Seja,

$$\begin{aligned} \mu : [G, G^\varphi] \langle \mathcal{K} \rangle &\longrightarrow G \otimes^q G \\ [g_1, g_2^\varphi] &\longmapsto g_1 \otimes g_2 \\ \{k\} &\longmapsto \{k\} \end{aligned}$$

Temos que $\Upsilon^q(G)$ é o quociente de $[G, G^\varphi] \langle \mathcal{K} \rangle$ pela relações definidoras de $\nu^q(G)$; usando as identidades (2.22) e (2.23) para reescrever essas relações, obtemos $\Upsilon^q(G)$ como o quociente de $[G, G^\varphi] \langle \mathcal{K} \rangle$ pelas seguintes relações:

$$[g_1 g_2, g_3^\varphi] = [g_1^{g_2}, (g_3^{g_2})^\varphi][g_2, g_3^\varphi]$$

$$[g_1, (g_2 g_3)^\varphi] = [g_1, g_3^\varphi][g_1^{g_3}, (g_2^{g_3})^\varphi]$$

$$\begin{aligned}
[g_1, g_2]^{\{k\}} &= [g_1^{k^q}, (g_2^{k^q})^\varphi] \\
\{kk'\} &= \{k\} \prod_{q-1}^{i=1} [k^{-1}, (k'^{i k^{1-q+i}})^\varphi] \{k'\} \\
[\{k\}, \{k'\}] &= [k^q, (k'^q)^\varphi] \\
\{[g_1, g_2]\} &= [g_1, g_2^\varphi]^q.
\end{aligned}$$

Mas essas relações são levadas por μ nas relações definidoras de $G \otimes^q G$; portanto μ induz um epimorfismo de $\Upsilon^q(G)$ em $G \otimes^q G$ (que também indicamos por μ).

Consideremos a aplicação

$$\begin{aligned}
\tau : G \otimes^q G &\rightarrow \Upsilon^q(G) \\
g_1 \otimes g_2 &\mapsto [g_1, g_2^\varphi] \cdot \\
\{k\} &\mapsto \{k\}
\end{aligned}$$

Temos que τ também é um epimorfismo, e como $\mu \cdot \tau = 1_{\Upsilon^q(G)}$ e $\tau \cdot \mu = 1_{G \otimes^q G}$, segue o isomorfismo desejado, isto é, $\Upsilon^q(G) \cong G \otimes^q G$. $\square$

O resultado a seguir, cuja demonstração foi baseada num resultado semelhante de Ellis em [6], é uma generalização de um resultado obtido por Rocco para $q = 0$ (cf. Proposição 1.8), e desempenha um papel importante no desenvolvimento subsequente do nosso trabalho.

Teorema 2.11 *Existe um isomorfismo:*

$$\nu^q(G) \cong ((G \otimes^q G) \rtimes G) \rtimes G^\varphi. \quad (2.24)$$

Demonstração:

Temos que $\nu^q(G) = \nu(G) * F(\mathcal{K})/J$ e $\Upsilon^q(G) = [G, G^\varphi]\langle \mathcal{K} \rangle \trianglelefteq \nu^q(G)$ e além disso, $\Upsilon^q(G) \cong G \otimes^q G$. Podemos formar o produto semi-direto $(G \otimes^q G) \rtimes G$ usando a ação de G sobre $G \otimes^q G$ dada por:
$$\begin{cases} [g_1, g_2^\varphi]^g = [g_1^g, (g_2^g)^\varphi] \\ \{k\}^g = \{k^g\} \end{cases}.$$

Além disso existe uma ação bem-definida de G^φ em $(G \otimes^q G) \rtimes G$ dada por:

$$(\tau, g_1)^{g^\varphi} = (\tau^{g^\varphi} [g, g_1^\varphi], g_1)$$

onde $\tau \in G \otimes^q G$, $g_1 \in G$ e $g^\varphi \in G^\varphi$.

Com estas ações podemos considerar o produto semi-direto $((G \otimes^q G) \rtimes G) \rtimes G^\varphi$.

Seja $\psi : \nu(G) * F(\mathcal{K}) \longrightarrow ((G \otimes^q G) \rtimes G) \rtimes G^\varphi$, o homomorfismo definido por:

$$\psi(g_1) = (1, g_1, 1),$$

$$\psi(g_2^\varphi) = (1, 1, g_2^\varphi),$$

$$\psi(\{k\}) = (\{k\}, 1, 1).$$

É fácil ver que $J \subseteq \ker(\psi)$, e assim ψ induz um homomorfismo bem-definido ϕ :

$$\phi : \nu(G) * F(K)/J \longrightarrow (G \otimes^q G) \rtimes G \rtimes G^\varphi \tag{2.25}$$

Temos o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccccc} \Upsilon^q(G) & \longrightarrow & \nu^q(G) & \longrightarrow & G \times G^\varphi \\ \downarrow \phi' & & \downarrow \phi & & \downarrow = \\ G \otimes^q G & \longrightarrow & (G \otimes^q G) \rtimes G \rtimes G^\varphi & \longrightarrow & G \times G^\varphi \end{array}$$

Onde ϕ' é a restrição de ϕ a $\Upsilon^q(G)$. Mas temos que ϕ' é um isomorfismo, e assim segue o resultado desejado.

□

A seguir identificamos o segundo grupo de homologia do grupo G com coeficientes no G -módulo trivial $\mathbb{Z}_q$, $H_2(G, \mathbb{Z}_q)$, com uma seção do grupo $\nu^q(G)$. Para isto consideremos as seguintes aplicações:

$$\begin{array}{ccc} \rho : \nu^q(G) & \longrightarrow & G \\ g & \longmapsto & g \\ g^\varphi & \longmapsto & g \\ \{k\} & \longmapsto & k^q \end{array}$$

$$\begin{aligned} \rho' = \rho|_{\Upsilon^q(G)} : \Upsilon^q(G) &\longrightarrow G \\ [g_1, g_2^{\varphi}] &\longmapsto [g_1, g_2] \\ \{k\} &\longmapsto k^q \end{aligned}$$

Agora consideremos os seguintes subgrupos:

$$\theta^q(G) = \ker(\rho); \quad (2.26)$$

$$\mu^q(G) = \ker(\rho') = \Upsilon^q(G) \cap \theta^q(G); \quad (2.27)$$

$$\Delta^q(G) = \langle [g, g^{\varphi}] \mid g \in G \rangle \leq \mu^q(G). \quad (2.28)$$

Como, $\theta^q(G) \trianglelefteq \nu^q(G)$, segue que $\theta(G)\Upsilon^q(G)$ é um subgrupo de $\nu^q(G)$.

Também temos que:

$$\Upsilon^q(G)/\mu^q(G) \cong \text{Im}(\rho') = G'G^q. \quad (2.29)$$

Teorema 2.12 *Seja $H_2(G, \mathbb{Z}_q)$ o segundo grupo de homologia do grupo G com coeficientes no G -módulo trivial $\mathbb{Z}_q$. Então $\mu^q(G)/\Delta^q(G) \cong H_2(G, \mathbb{Z}_q)$.*

Demonstração:

Seja F / R uma apresentação livre de G .

Em [6], temos que :

$$G \wedge^q G \cong F'F^q / R^q[R, F].$$

E pelo isomorfismo (1.16), Capítulo 1, segue que:

$$H_2(G, \mathbb{Z}_q) \cong (G \wedge^q G) \cap R / R^q[R, F].$$

Mas,

$$R / R^q[R, F] = M^q(G) : q - \text{multiplicador de } G.$$

Ou seja,

$$H_2(G, \mathbb{Z}_q) \cong (G \wedge^q G) \cap (M^q(G)).$$

Temos a sequência exata:

$$H_2(G, \mathbb{Z}_q) \xrightarrow{\alpha} G \wedge^q G \xrightarrow{\beta} G$$

onde β é induzida por ρ' . Logo, $\ker(\beta) \cong H_2(G, \mathbb{Z}_q)$.

Mas, $\mu^q(G)/\Delta^q(G) \cong \ker(\beta)$. E assim segue o isomorfismo:

$$\mu^q(G) / \Delta^q(G) \cong H_2(G, \mathbb{Z}_q).$$

□

Observação 2.7 *Uma outra formulação deste resultado foi obtida por McDermott (cf. [14]).*

Proposição 2.12 [2] *Se G é q -perfeito então $\Upsilon^q(G)/\Delta^q(G)$ é a única extensão q -central universal de G , a menos de isomorfismos.*

Com os resultados e notações apresentados acima, obtemos o seguinte diagrama:

Diagrama 1

Capítulo 3

O Quadrado q -Tensorial de um Grupo Solúvel

Neste capítulo abordaremos algumas propriedades do produto q -tensorial de grupos solúveis, propriedades que são preservadas e as séries centrais dos grupos envolvidos. Construiremos também uma tabela de exemplos de grupos $\nu^q(G)$, para grupos G de ordem pequena, e seus principais subgrupos.

Consideremos G e G^φ grupos solúveis, finitos, distintos e isomorfos dados pelos AG-sistemas $\{a_1, \dots, a_n\}$ e $\{b_1, \dots, b_n\}$, respectivamente, onde $\varphi : G \mapsto G^\varphi$ é um isomorfismo tal que $a_i \mapsto b_i$, $1 \leq i \leq n$. As correspondentes relações potências-conjugados satisfeitas por estes sistemas são chamadas de G -relações e G^φ -relações.

Sejam S' , R'_1 , R'_2 e R'_3 as relações correspondentes às relações S , R_1 , R_2 e R_3 consideradas para todos $g \in \{a_1, \dots, a_n\}$, $g^\varphi \in \{b_1, \dots, b_n\}$ e para todo $\{k\} \in \mathcal{K}$.

Proposição 3.13 *Os conjuntos de relações $\{S', R'_1, R'_2, R'_3\}$ e $\{S, R_1, R_2, R_3\}$ são equivalentes.*

Demonstração:

A demonstração para o conjunto de relações S foi feita em [20].

Agora consideremos $g_1 = a_1^{\alpha_1} \dots a_n^{\alpha_n}$ e $g_2 = a_1^{\beta_1} \dots a_n^{\beta_n}$, elementos quaisquer de G , onde $0 \leq \alpha_j, \beta_j \leq r_j$, $1 \leq j \leq n$. De acordo com (1.8).

(i) R_1

Por hipótese temos que : $\{k\}^g = \{k^g\}$, $\forall g \in \{a_1, \dots, a_n\}$. Daí,

$$\begin{aligned} \{k\}^{g_1} &= g_1^{-1} \{k\} g_1 \\ &= a_n^{-\alpha_n} \dots a_2^{-\alpha_2} a_1^{-\alpha_1} \{k\} a_1^{\alpha_1} a_2^{\alpha_2} \dots a_n^{\alpha_n} \\ &= a_n^{-\alpha_n} \dots a_2^{-\alpha_2} a_1^{-1} \dots a_1^{-1} (a_1^{-1} \{k\} a_1) a_1 \dots a_1 \cdot a_2^{\alpha_2} \dots a_n^{\alpha_n} \\ &= a_n^{-\alpha_n} \dots a_2^{-\alpha_2} \cdot a_1^{-1} \dots a_1^{-1} \{k^{a_1}\} a_1 \dots a_1 \cdot a_2^{\alpha_2} \dots a_n^{\alpha_n} \end{aligned}$$

Como $k^{a_1} \in G$, segue que $\{k^{a_1}\} \in \mathcal{K}$ e podemos então seguir assim repetidamente, de maneira que obtemos a seguinte igualdade:

$$\{k\}^{g_1} = \{k^{g_1}\}, \text{ para todos } k, g_1 \in G.$$

(ii) R_2

De maneira análoga temos que:

$$\{k\}^{g_2^\varphi} = \{k^{g_2}\}, \forall g_2^\varphi \in G^\varphi.$$

(iii) R_3

Por hipótese, temos que:

$$[g, h^\varphi]^{\{k\}} = [g^{k^q}, (h^{k^q})^\varphi]$$

para todos $g \in \{a_1, \dots, a_n\}$ e $h^\varphi \in \{b_1, \dots, b_n\}$.

Considere a_1 , a_2 e a_3 geradores de G . Então segue que:

$$[a_1, a_3^\varphi]^{\{k\}} = [a_1^{k^q}, (a_3^{k^q})^\varphi] \quad (3.1)$$

$$[a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} = [a_2^{k^q}, (a_3^{k^q})^\varphi] \quad (3.2)$$

para todo $k \in G$.

Primeiramente mostraremos que:

$$[a_1 a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} = [(a_1 a_2)^{k^q}, (a_3^{k^q})^\varphi]$$

Pois,

$$\begin{aligned} [a_1 a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} &= ([a_1, a_3^\varphi]^{a_2} [a_2, a_3^\varphi])^{\{k\}} \\ &= [a_1, a_3^\varphi]^{a_2 \{k\}} [a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} \\ &= [a_1, a_3^\varphi]^{(a_2 \{k\} a_2^{-1}) a_2} [a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} \\ &= [a_1, a_3^\varphi]^{\{k^{a_2^{-1}}\} a_2} [a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} \\ &= [a_1^{(k^{a_2^{-1}})^q}, (a_3^{(k^{a_2^{-1}})^q})^\varphi]^{a_2} [a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} \\ &= [a_1^{(k^q)^{a_2^{-1}}}, (a_3^{(k^q)^{a_2^{-1}}})^\varphi]^{a_2} [a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} \\ &= [a_1^{a_2 k^q a_2^{-1}}, (a_3^{a_2 k^q a_2^{-1}})^\varphi]^{a_2} [a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} \\ &= [a_1^{a_2 k^q}, (a_3^{a_2 k^q})^\varphi] [a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}}. \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} [(a_1 a_2)^{k^q}, (a_3^{k^q})^\varphi] &= [a_1^{k^q} a_2^{k^q}, (a_3^{k^q})^\varphi] \\ &= [(a_1)^{k^q}, (a_3^{k^q})^\varphi]^{a_2 k^q} [a_2^{k^q}, (a_3^{k^q})^\varphi] \\ &= [(a_1)^{k^q}, (a_3^{k^q})^\varphi]^{k^{-q} a_2 k^q} [a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} \\ &= [a_1, a_3^\varphi]^{a_2 k^q} [a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} \\ &= [a_1^{a_2 k^q}, (a_3^{a_2 k^q})^\varphi] [a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} \end{aligned}$$

Então,

$$[a_1 a_2, a_3^\varphi]^{\{k\}} = [(a_1 a_2)^{k^q}, (a_3^{k^q})^\varphi].$$

Procedendo desta maneira, segue o resultado. □

Tendo em vista o teorema acima, podemos diminuir os cálculos dos exemplos que envolvem grupos solúveis, pois diminuimos assim o número de relações.

3.1 Exemplos

Com o objetivo de visualizarmos o grupo $\nu^q(G)$ e seus principais subgrupos começamos construindo um grupo de ordem pequena, $\nu^3(S_3)$. Neste exemplo podemos utilizar a Proposição 3.13, o que facilita bastante os cálculos. Temos que:

$$S_3 = \langle a_1, a_2 \mid a_1^3, a_2^2, a_1 a_2 = a_1^{-1} \rangle \quad (3.3)$$

$$S_3^\varphi = \langle b_1, b_2 \mid b_1^3, b_2^2, b_1 b_2 = b_1^{-1} \rangle \quad (3.4)$$

e que o levantamento de S_3 , denotado por $\mathcal{K}$, é o grupo gerado pelo conjunto: $\{z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6\}$, onde $z_1 = \{1\}$, $z_2 = \{a_1\}$, $z_3 = \{a_1^2\}$, $z_4 = \{a_2\}$, $z_5 = \{a_1 a_2\}$, $z_6 = \{a_1^2 a_2\}$. Então inicialmente temos a seguinte apresentação de $\nu^3(S_3)$:

$$\begin{aligned} \nu^3(S_3) = \langle a_1, a_2, b_1, b_2, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6 \mid a_1^3, \\ a_2^2, a_1 a_2 = a_1^{-1}, b_1^3, b_2^2, b_1 b_2 = b_1^{-1}, S, R \rangle \end{aligned} \quad (3.5)$$

onde S e R são dadas em (2.13) a (2.20).

Pela Proposição 3.13, nos conjuntos de relações S , R_1 , R_2 e R_3 consideraremos apenas as relações envolvendo os elementos geradores do grupo $\nu^3(S_3)$.

Dessa maneira obtemos uma apresentação de $\nu^3(S_3)$ com 10 geradores e 130 relações. Usando transformações de Tietze no sistema **GAP** (cf. [9]) reduzimos a apresentação, chegando a 5 geradores e 15 relações.

O grupo $[S_3, S_3^\varphi]$ é trivial e $\mathcal{K}$ é isomorfo a C_2 . Portanto, pelo isomorfismo em (2.21), temos que $S_3 \otimes^3 S_3$ é isomorfo a C_2 . Pelo Teorema 2.11 segue o seguinte isomorfismo:

$$\nu^3(S_3) \cong (C_2 \times S_3) \times S_3^\varphi \quad (3.6)$$

Usando o sistema GAP construímos a tabela a seguir, que exhibe exemplos de $\nu^q(G)$ para alguns grupos não-abelianos G de ordens pequenas, para $q = 2, 3$ ou 4. Calculamos para cada grupo G , e inteiro q , a ordem de $\nu^q(G)$ e identificamos alguns subgrupos importantes.

Tabela 3.1:

GRUPO G	q	$ \nu^q(G) $	$\nu^q(G)$	$G \otimes^q G$	$[G, G^\varphi]$	K
D_4	0	2^{11}	$(C_4 \times C_2^3) \rtimes D_4$	$C_4 \times C_2^3$	$C_4 \times C_2^3$	1
D_4	2	256	$((C_2 \times C_2) \rtimes D_4) \rtimes D_4$	$C_2 \times C_2$	C_2	C_2
D_4	3	128	$(C_2 \times D_4) \rtimes D_4$	C_2	1	C_2
D_4	4	128	$(C_2 \times D_4) \rtimes D_4$	C_2	1	C_2
S_3	2	144	$(C_4 \rtimes S_3) \rtimes S_3$	C_4	C_2	C_4
S_3	3	72	$(C_2 \times S_3) \rtimes S_3$	C_2	1	C_2
S_3	4	144	$(C_2 \times C_2) \rtimes S_3) \rtimes S_3$	$C_2 \times C_2$	C_2	C_2
Q_8	0	2^7	$(C_4^2 \times C_2^2) \rtimes Q_8$	$C_4^2 \times C_2^2$	$C_4^2 \times C_2^2$	1
Q_8	2	128	$(C_2 \times Q_8) \rtimes Q_8$	C_2	C_2	1
Q_8	3	64	$(1 \times Q_8) \rtimes Q_8$	1	1	1
Q_8	4	2048	$(TC_2 \times Q_8) \rtimes Q_8$	TC_2	T	C_2
D_5	2	400	$(C_4 \rtimes D_5) \rtimes D_5$	C_4	C_2	C_4
D_5	3	200	$(C_2 \times D_5) \rtimes D_5$	C_2	1	C_2
D_5	4	200	$(C_2 \times D_5) \rtimes D_5$	C_2	1	C_2

onde T é o grupo abeliano elementar de ordem 16 e os casos em que $q = 0$ foram obtidos em [20].

Agora, se G é um grupo abeliano, vimos no Teorema 2.9 o seguinte isomorfismo:

$$G \otimes^q G \cong (G/G^q) \otimes_{\mathbb{Z}} (G/G^q). \quad (3.7)$$

Temos que $\nu^q(G)$ foi definido como o produto semi-direto $((G \otimes^q G) \rtimes G) \rtimes G^\varphi$, onde na construção de $(G \otimes^q G) \rtimes G$ consideramos a seguinte ação de G sobre $G \otimes^q G$:

$$[g_1, g_2^\varphi]^g = [g_1^g, (g_2^g)^\varphi]$$

$$\{k\}^g = \{k^g\}$$

para $g_1, g_2, g \in G$ e $\{k\} \in \mathcal{K}$.

Na construção de $((G \otimes^q G) \rtimes G) \rtimes G^\varphi$ consideramos a seguinte ação de G^φ sobre $(G \otimes^q G) \rtimes G$:

$$(\tau, g)^{x^\varphi} = (\tau^{x^\varphi}[g, x^\varphi], g)$$

onde $\tau \in G \otimes^q G$ e $g, x \in G$.

Portanto quando consideramos G um grupo abeliano, a ação de G em $G \otimes^q G$ é trivial, ou seja, $(G \otimes^q G) \rtimes G = (G \otimes^q G) \times G$. E a ação de G^φ em $(G \otimes^q G) \times G$ é dada por:

$$(\tau, g)^{x^\varphi} = (\tau[g, x^\varphi], g).$$

Sendo assim,

$$\nu^q(G) = ((G \otimes^q G) \times G) \rtimes G^\varphi \quad (3.8)$$

com a ação dada acima.

Primeiro consideremos o caso em que $\text{mcd}(q, n) = 1$ e G é o grupo cíclico de ordem n , C_n .

Neste caso, $G^q = G$, e daí G/G^q é trivial e pelo isomorfismo em (3.1) segue que $G \otimes^q G$ também é trivial. Logo,

$$\nu^q(C_n) = C_n \times C_n^\varphi.$$

Agora no caso em que $\text{mdc}(q, n) = d \neq 1$, $G^q \cong C_{n/d}$, e então a ordem de G/G^q é d , ou seja, $G/G^q \cong C_d$. Portanto,

$$G \otimes^q G \cong C_d \otimes_{\mathbb{Z}} C_d \cong C_d.$$

Segue que:

$$\nu^q(C_n) = (C_d \times C_n) \rtimes C_n^\varphi \quad (3.9)$$

onde C_n^φ é isomorfo a C_n através do isomorfismo φ .

Logo, se considerarmos $C_d = \langle x|x^d \rangle$, $C_n = \langle y|y^n \rangle$ e $C_n^\varphi = \langle z|z^n \rangle$, teremos:

$$\nu^q(G) = \langle x, y, z|x^d, y^n, z^n, [x, y], [x, z], y^z = yx^m \rangle.$$

Finalmente seja G um grupo abeliano finito. Então G é o produto direto de um número finito de grupos cíclicos finitos. Suponhamos que $G = C_{d_1} \times C_{d_2} \times \dots \times C_{d_k}$ e $G = \langle x_1, x_2, \dots, x_k \rangle$, onde $\langle x_i \rangle \cong C_{d_i}$, para $i = 1, \dots, k$, e $d_i | d_{i+1}$, para $i = 1, \dots, k-1$.

Neste caso, $G/G^q \cong C_{d_1'} \times C_{d_2'} \times \dots \times C_{d_k'}$, onde $d_i' = \text{mdc}(q, d_i)$, para $i = 1, \dots, k$. Portanto, $d_i' | d_{i+1}'$ e

$$G \otimes^q G \cong (C_{d_1'} \times C_{d_2'} \times \dots \times C_{d_k'}) \otimes_{\mathbb{Z}} (C_{d_1'} \times C_{d_2'} \times \dots \times C_{d_k'})$$

Mas o produto tensorial usual se distribui sobre o produto direto, e como $C_{d_i'} \otimes_{\mathbb{Z}} C_{d_j'} \cong C_{d_i'}$, para todo $k \geq j > i$, segue que:

$$\begin{aligned} G \otimes^q G &\cong C_{d_1'} \dots \times C_{d_1'} \times C_{d_2'} \times \dots \times C_{d_2'} \times \dots \times C_{d_{k-1}'} \times C_{d_{k-1}'} \times C_{d_k'} = \\ &= \langle v_{1_1}, v_{1_2}, \dots, v_{1_k}, v_{2_1}, v_{2_2}, \dots, v_{2_{k-1}}, \dots, v_{k_1} \rangle \end{aligned}$$

E temos a seguinte apresentação de $\nu^q(G)$:

$$\langle v_{1_1}, v_{1_2}, \dots, v_{1_k}, v_{2_1}, v_{2_2}, \dots, v_{2_{k-1}}, \dots, v_{k_1}, x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_k | [v_i, v_j], v_{i_j}^{d_{i_j}'},$$

$$[v_i, x_j], [v_i, y_j], x_i^{d_i}, y_i^{d_i}, x_i^{y_j} = x_i v_{i_j}, \forall i, j = 1, \dots, k \rangle.$$

Capítulo 4

O Quadrado q-Tensorial de um Grupo Nilpotente

Neste capítulo calculamos as séries centrais de alguns subgrupos importantes de $\nu^q(G)$. Fazemos um estudo sobre a nilpotência de $G \otimes^q G$ e de $\nu^q(G)$. Posteriormente trabalhamos com grupos nilpotentes finitos.

Para simplificar a notação denotaremos o subgrupo $\langle \mathcal{K} \rangle$ de $\nu^q(G)$ por K .

Usaremos a seguinte proposição para calcularmos a série central inferior do subgrupo K de $\nu^q(G)$.

Proposição 4.14 *Sejam $x_1, x_2, \dots, x_n \in G$. Então, em $\nu^q(G)$, temos a seguinte igualdade:*

$$[\{x_1\}^{e_1}, \dots, \{x_{n-1}\}^{e_{n-1}}, \{x_n\}^{e_n}] = [x_1^{e_1 q}, \dots, x_{n-1}^{(e_{n-1})q}, (x_n^{e_n q})^q], \text{ para todo } n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

onde $e_i = \pm 1$, para todo $i = 1, \dots, n$.

Demonstração:

Usaremos indução sobre n . Primeiro consideraremos $n = 2$ e provaremos que para quaisquer $x, y \in G$ e $e_1, e_2 \in \{1, -1\}$,

$$[\{x\}^{e_1}, \{y\}^{e_2}] = [x^q, (y^q)^q].$$

O caso $e_1 = e_2 = 1$ segue da relação R_5 de $\nu^q(G)$.

Consideremos agora o caso $e_1 = -e_2 = 1$. Começamos observando que, por R_4 ,

$$1_{\nu^q(G)} = \{1\} = \{yy^{-1}\} = \{y\} \prod_{i=1}^{q-1} [y^{-1}, (y^{-i})^\varphi] \{y^{-1}\},$$

ou seja,

$$\{y\}^{-1} = \prod_{i=1}^{q-1} [y^{-1}, (y^{-i})^\varphi] \{y^{-1}\} = f(y, y^{-1}) \{y^{-1}\}.$$

Portanto,

$$[\{x\}, \{y\}^{-1}] = [\{x\}, f(y, y^{-1}) \{y^{-1}\}] = [\{x\}, \{y^{-1}\}] [\{x\}, f(y, y^{-1})] \{y^{-1}\}.$$

Onde,

$$[\{x\}, f(y, y^{-1})] = [x^q, f(y, y^{-1})] =$$

por R_3 ,

$$\begin{aligned} &= [x^q, \prod_{i=1}^{q-1} [y^{-1}, (y^{-i})^\varphi]] = \\ &= [x^q, \prod_{i=1}^{q-2} [y^{-1}, (y^{-i})^\varphi] [y^{-1}, (y^{-q+1})^\varphi]] \\ &= [x^q, [y^{-1}, (y^{-q+1})^\varphi]] [x^q, \prod_{i=1}^{q-2} [y^{-1}, (y^{-i})^\varphi]] [y^{-1}, (y^{-q+1})^\varphi]. \end{aligned}$$

Mas,

$$[x^q, [y^{-1}, (y^{-q+1})^\varphi]] = [[y^{-1}, (y^{-q+1})^\varphi], x^q]^{-1} = [y^{-1}, (y^{-q+1})^\varphi, x^q]^{-1}$$

pelo Lema 1.2,

$$= [y^{-1}, y^{-q+1}, (x^q)^\varphi]^{-1} = [[y^{-1}, (y^{-q+1})^\varphi], (x^q)^\varphi]^{-1} = 1.$$

Abrindo o comutador

$$[x^q, \prod_{i=1}^{q-2} [y^{-1}, (y^{-i})^\varphi],$$

de maneira análoga ao caso anterior, e fazendo o uso dos mesmos argumentos repetidas vezes, segue que $[\{x\}, f(y, y^{-1})] = 1$. Portanto,

$$[\{x\}, \{y\}^{-1}] = [\{x\}, \{y^{-1}\}].$$

Os casos $e_1 = -e_2 = -1$ e $e_1 = e_2 = -1$ seguem por simetria.

Suponhamos, por indução, que para quaisquer $x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \in G$ e $l_1, l_2, \dots, l_{n-1} \in \{1, -1\}$,

$$[\{x_1\}^{l_1}, \{x_2\}^{l_2}, \dots, \{x_{n-1}\}^{l_{n-1}}] = [x_1^{ql_1}, x_2^{ql_2}, \dots, (x_{n-1}^{ql_{n-1}})^\varphi].$$

Se x_n também é um elemento de G e $l_n \in \{1, -1\}$, então

$$\begin{aligned} [\{x_1\}^{l_1}, \dots, \{x_{n-1}\}^{l_{n-1}}, \{x_n\}^{l_n}] &= [[\{x_1\}^{l_1}, \{x_2\}^{l_2}, \dots, \{x_{n-1}\}^{l_{n-1}}], \{x_n\}^{l_n}] = \\ &= [\{x_1\}^{l_1}, \{x_2\}^{l_2}, \dots, \{x_{n-1}\}^{l_{n-1}}]^{-1} [\{x_1\}^{l_1}, \{x_2\}^{l_2}, \dots, \{x_{n-1}\}^{l_{n-1}}] \{x_n\}^{l_n} \\ &= [x_1^{l_1q}, x_2^{l_2q}, \dots, (x_{n-1}^{l_{n-1}q})^\varphi]^{-1} [x_1^{l_1q}, x_2^{l_2q}, \dots, (x_{n-1}^{l_{n-1}q})^\varphi] \{x_n\}^{l_n}, \end{aligned}$$

pela hipótese de indução.

Se $e_n = 1$, por R_3 segue que

$$\begin{aligned} &[\{x_1\}^{l_1}, \dots, \{x_{n-1}\}^{l_{n-1}}, \{x_n\}] = \\ &= [x_1^{l_1q}, x_2^{l_2q}, \dots, (x_{n-1}^{l_{n-1}q})^\varphi]^{-1} [x_1^{l_1q}, x_2^{l_2q}, \dots, (x_{n-1}^{l_{n-1}q})^\varphi] x_n^q = \\ &= [[x_1^{l_1q}, \dots, (x_{n-1}^{l_{n-1}q})^\varphi], x_n^q] = [x_1^{l_1q}, \dots, x_{n-1}^{l_{n-1}q}, (x_n^q)^\varphi], \end{aligned} \tag{4.1}$$

pelo Lema 1.2.

Se $e_n = -1$,

$$\begin{aligned} &[\{x_1\}^{l_1}, \dots, \{x_{n-1}\}^{l_{n-1}}, \{x_n\}^{-1}] = [[x_1^{l_1q}, x_2^{l_2q}, \dots, (x_{n-1}^{l_{n-1}q})^\varphi], \{x_n\}^{-1}] = \\ &= [[x_1^{l_1q}, x_2^{l_2q}, \dots, (x_{n-1}^{l_{n-1}q})^\varphi], f(x_n, x_n^{-1}) \{x_n^{-1}\}] = \\ &= [[x_1^{l_1q}, x_2^{l_2q}, \dots, (x_{n-1}^{l_{n-1}q})^\varphi], \{x_n^{-1}\}] [[x_1^{l_1q}, x_2^{l_2q}, \dots, (x_{n-1}^{l_{n-1}q})^\varphi], f(x_n, x_n^{-1}) \{x_n^{-1}\}]. \end{aligned}$$

Reescrevendo $f(x_n, x_n^{-1})$, como no primeiro passo de indução, e usando a Proposição 1.10, segue que

$$[[x_1^{l_1q}, x_2^{l_2q}, \dots, (x_{n-1}^{l_{n-1}q})^\varphi], f(x_n, x_n^{-1})] = 1,$$

e, por (4.1), temos que

$$[[x_1^{l_1q}, x_2^{l_2q}, \dots, (x_{n-1}^{l_{n-1}q})^\varphi], \{x_n^{-1}\}] = [x_1^{l_1q}, \dots, x_{n-1}^{l_{n-1}q}, (x_n^{-q})^\varphi].$$

Portanto,

$$[\{x_1\}^{l_1}, \dots, \{x_{n-1}\}^{l_{n-1}}, \{x_n\}^{-1}] = [x_1^{l_1q}, \dots, x_{n-1}^{l_{n-1}q}, (x_n^{-q})^\varphi],$$

seguinto assim o resultado desejado. $\square$

4.1 A Série Central Inferior de K

Proposição 4.15 *Em $\nu^q(G)$ temos a seguinte propriedade:*

$$\gamma_i(K) \subseteq [\gamma_{i-1}(G^q), (G^q)^\varphi], \text{ para todo } i \in \mathbb{N}, i \geq 2.$$

Demonstração:

Primeiro consideraremos $i = 2$. Temos que,

$$\gamma_2(K) = \langle [k, k'] \mid k, k' \in K \rangle.$$

Para provarmos que $\gamma_2(K) \subseteq [G^q, (G^q)^\varphi]$ usaremos indução sobre o comprimento das palavras em K , lembrando que $K = \langle \{x\} \mid x \in G \rangle$. Sejam,

$$x_1 = \{a_1\}^{l_1}, x_2 = \{a_2\}^{l_2}, \dots, x_m = \{a_m\}^{l_m},$$

$$y_1 = \{b_1\}^{r_1}, y_2 = \{b_2\}^{r_2}, \dots, y_m = \{b_m\}^{r_m},$$

palavras em K de comprimento 1, onde $l_j, r_j = \pm 1$, para $j = 1, \dots, m$. E sejam $t_1 = [x_1, y_1], \dots, t_m = [x_m, y_m]$ elementos de $\gamma_2(K)$.

Pela Proposição 4.14, segue que $t_i = [x_i, y_i] \in [G^q, (G^q)^\varphi]$, e assim $t = t_1 t_2 \dots t_m \in [G^q, (G^q)^\varphi]$.

Agora suponhamos, por indução, que se u_j e v_j são palavras quaisquer em K de comprimento $r - 1$ e $s - 1$, respectivamente, para $j = 1, \dots, m$, então $[u_1, v_1] \dots [u_m, v_m] \in [G^q, (G^q)^\varphi]$.

Sejam x_j e y_j , para $j = 1, \dots, m$, palavras em K de comprimentos r e s , respectivamente. Podemos escrever

$$x_j = u_j\{a_j\}, \quad y_j = v_j\{b_j\}$$

onde u_j e v_j são palavras em K de comprimentos $r - 1$ e $s - 1$, respectivamente, nos geradores de K . Portanto,

$$t_j = [x_j, y_j] = [u_j\{a_j\}, v_j\{b_j\}] = [u_j, \{b_j\}]^{\{a_j\}} [u_j, v_j]^{\{b_j\}\{a_j\}} [\{a_j\}, \{b_j\}] [\{a_j\}, v_j]^{\{b_j\}}.$$

Mas pelo primeiro passo de indução,

$$[\{a_j\}, \{b_j\}] \in [G^q, (G^q)^\varphi]$$

e, por R_3 e a hipótese de indução, os comutadores

$$[u_j, \{b_j\}]^{\{a_j\}}, [u_j, v_j]^{\{b_j\}\{a_j\}}, [\{a_j\}, v_j]^{\{b_j\}}$$

pertencem a $[G^q, (G^q)^\varphi]$.

Portanto, $t_j \in [G^q, (G^q)^\varphi]$, para $j = 1, \dots, m$, e assim $t = t_1 t_2 \dots t_m \in [G^q, (G^q)^\varphi]$.

Logo, $\gamma_2(K) \subseteq [G^q, (G^q)^\varphi]$.

Procedemos agora por indução sobre n , admitindo que $\gamma_n(K) \subseteq [\gamma_{n-1}(G^q), (G^q)^\varphi]$.

Para provarmos que $\gamma_{n+1}(K) \subseteq [\gamma_n(G^q), (G^q)^\varphi]$ usaremos indução sobre o comprimento das palavras em K .

Primeiro consideremos as seguintes palavras em K de comprimento 1

$$z_{11} = \{x_{11}\}^{l_{11}}, \dots, z_{1(n+1)} = \{x_{1(n+1)}\}^{l_{1(n+1)}}, \dots,$$

$$z_{m1} = \{x_{m1}\}^{l_{m1}}, \dots, z_{m(n+1)} = \{x_{m(n+1)}\}^{l_{m(n+1)}}$$

onde $l_{ij} = \pm 1$, para $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, (n + 1)$.

Sejam,

$$t_i = [z_{i1}, \dots, z_{in}, z_{i(n+1)}] = [[z_{i1}, \dots, z_{in}], z_{i(n+1)}]$$

para $i = 1, \dots, m$, elementos de $\gamma_{n+1}(K)$. Pela hipótese de indução, $[z_{i1}, \dots, z_{in}] \in [\gamma_{n-1}(G^q), (G^q)^\varphi]$.

Para $[z_{i1}, \dots, z_{in}] = [a, b^\varphi]$, onde $a \in \gamma_{n-1}(G^q)$ e $b \in G^q$, temos

$$t_i = [[a, b^\varphi], \{x_{i(n+1)}\}^{l_{i(n+1)}}] = [[a, b^\varphi], (x_{i(n+1)}^q)^{l_{i(n+1)}}] = [[a, b], ((x_{i(n+1)}^{l_{i(n+1)}})^q)^\varphi],$$

pela Proposição 4.14, e assim, $t_i \in [\gamma_n(G^q), (G^q)^\varphi]$. Portanto,

$$t = t_1 t_2 \dots t_m \in [\gamma_n(G^q), (G^q)^\varphi].$$

Suponhamos, por indução, que se $u_{11}, \dots, u_{m(n+1)}$ são palavras em K , onde $u_{i1}, u_{i2}, \dots, u_{i(n+1)}$ têm comprimentos $r_1 - 1, r_2 - 2, \dots, r_{n+1} - 1$, respectivamente, para $i = 1, \dots, m$, então,

$$t_1 = [u_{11}, \dots, u_{1(n+1)}], \dots, t_m = [u_{m1}, \dots, u_{m(n+1)}]$$

e $t = t_1 \dots t_m \in [\gamma_n(G^q), (G^q)^\varphi]$.

Sejam $s_{i1}, \dots, s_{i(n+1)}$ palavras em K de comprimentos $r_1, r_2, \dots, r_{n+1}$, respectivamente, para $i = 1, \dots, m$. Podemos escrever,

$$s_{ij} = u_{ij} \{x_{ij}\}, \text{ para } j = 1, \dots, n+1, \text{ e para } i = 1, \dots, m$$

onde u_{ij} , para $j = 1, \dots, (n+1)$, são palavras em K de comprimentos $r_j - 1$, respectivamente, nos geradores de K , para $i = 1, \dots, m$.

Sejam,

$$t_1 = [s_{11}, \dots, s_{1(n+1)}], \dots, t_m = [s_{m1}, \dots, s_{m(n+1)}],$$

elementos de $\gamma_{n+1}(K)$.

Temos que,

$$\begin{aligned} t_i &= [s_{i1}, \dots, s_{in}, s_{i(n+1)}] = [[s_{i1}, \dots, s_{in}], s_{i(n+1)}] = \\ &= [[s_{i1}, \dots, s_{in}], u_{i(n+1)} \{x_{i(n+1)}\}] = [[s_{i1}, \dots, s_{in}], \{x_{i(n+1)}\}] [[s_{i1}, \dots, s_{in}], u_{i(n+1)}]^{x_{i(n+1)}}. \end{aligned}$$

Abrindo o comutador $[s_{i1}, \dots, s_{in}]$, ao escrevermos cada palavra s_{ij} da seguinte maneira,

$$s_{ij} = u_{ij}\{x_{ij}\}, \text{ para } j = 1, \dots, n$$

usando R_3 e a hipótese de indução sobre o comprimento das palavras em K , segue que,

$$[[s_{i1}, \dots, s_{in}], u_{i(n+1)}] \in [\gamma_n(G^q), (G^q)^\varphi].$$

Por outro lado, se $[s_{i1}, \dots, s_{in}] = [a, b^\varphi]$, onde $a \in \gamma_{n-1}(G^q)eb \in G^q$, temos

$$[[s_{i1}, \dots, s_{in}], \{x_{i(n+1)}\}] = [[a, b^\varphi], \{x_{i(n+1)}\}].$$

Por R_3 e o Lema 1.2, segue que

$$[[a, b^\varphi], \{x_{i(n+1)}\}] \in [\gamma_n(G^q), (G^q)^\varphi].$$

Um argumento de indução usando cálculo de comutadores e as relações de $\nu^q(G)$ mostram que, para qualquer $[s_{i1}, \dots, s_{in}] = [a_1, b_1^\varphi][a_2, b_2^\varphi] \dots [a_m, b_m^\varphi] \in [\gamma_{n-1}(G^q), (G^q)^\varphi]$ vale,

$$[[s_{i1}, \dots, s_{in}], \{x_{i(n+1)}\}] \in [\gamma_n(G^q), (G^q)^\varphi]$$

e conseqüentemente,

$$t = t_1 t_2 \dots t_m \in [\gamma_n(G^q), (G^q)^\varphi].$$

Portanto,

$$\gamma_{n+1}(K) \subseteq [\gamma_n(G^q), (G^q)^\varphi]. \quad (4.2)$$

□

4.2 A Série Central Inferior de T

Seja $T = [G, G^\varphi] \leq \nu_q(G)$. Então:

$$T = \langle [g, h^\varphi] \mid g, h \in G \rangle. \quad (4.3)$$

Na proposição a seguir usaremos algumas propriedades de produtos tensoriais de grupos não-abelianos listadas no Capítulo 1.

Proposição 4.16 *Sejam $[x_1, x_2^\varphi]$ e $[y_1, y_2^\varphi]$ elementos quaisquer de T . Então:*

$$[[x_1, x_2^\varphi]^{e_1}, [y_1, y_2^\varphi]^{e_2}] = [[x_1, x_2]^{e_1}, ([y_1, y_2]^{e_2})^\varphi] \quad (4.4)$$

onde $e_1, e_2 = \pm 1$.

Demonstração:

Primeiro consideraremos $e_1 = e_2 = 1$. Assim,

$$\begin{aligned} [[x_1, x_2^\varphi], [y_1, y_2^\varphi]] &= [x_1, x_2^\varphi]^{-1} \cdot [x_1, x_2^\varphi]^{[y_1, y_2^\varphi]} \\ &= [x_1, x_2^\varphi]^{-1} \cdot [x_1, x_2^\varphi]^{[y_1, y_2]} \\ &= [x_1, x_2^\varphi]^{-1} \cdot [x_1, x_2^\varphi]^{[y_1, y_2]^\varphi} \\ &= [[x_1, x_2^\varphi], [y_1, y_2]^\varphi] \\ &= [x_1, x_2^\varphi, [y_1, y_2]^\varphi] \\ &= [x_1, x_2, [y_1, y_2]^\varphi] \\ &= [[x_1, x_2], [y_1, y_2]^\varphi]. \end{aligned}$$

No caso em que $\theta_1 = -1 = -\theta_2$, temos:

$$\begin{aligned} [[x_1, x_2^\varphi]^{-1}, [y_1, y_2^\varphi]] &= [x_1, x_2^\varphi]([x_1, x_2^\varphi]^{-1})^{[y_1, y_2^\varphi]} = \\ &= [x_1, x_2^\varphi]([x_1, x_2^\varphi]^{[y_1, y_2^\varphi]})^{-1} = \\ &= [x_1, x_2^\varphi]([x_1, x_2^\varphi]^{[y_1, y_2]})^{-1} = \\ &= [[x_1, x_2^\varphi]^{-1}, [y_1, y_2]] = [[x_1^{-1}, (x_2^{x_1})^\varphi], [y_1, y_2]] = \\ &= [x_1^{-1}, (x_2^{x_1})^\varphi, [y_1, y_2]] = [x_1^{-1}, x_2^{x_1}, [y_1, y_2]^\varphi] \\ &= [[x_1^{-1}, x_2^{x_1}], [y_1, y_2]^\varphi] = [[x_1, x_2]^{-1}, [y_1, y_2]^\varphi]. \end{aligned}$$

Por simetria seguem os outros casos e o resultado desejado. $\square$

Proposição 4.17 *Em $\nu^q(G)$ temos a seguinte propriedade:*

$$\gamma_i(T) \subseteq [\gamma_{i-1}(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi]$$

para $i \in \mathbb{N}$, $i \geq 2$.

Demonstração: Primeiro consideremos $i = 2$. Temos que:

$$\gamma_2(T) = \langle [x, y] \mid x, y \in T \rangle.$$

Para provarmos que $\gamma_2(T) \subseteq [\gamma_2(G), \gamma_2(G)^\varphi]$ usaremos indução sobre o comprimento das palavras em T .

Sejam,

$$x_1 = [a_1, b_1^\varphi]^{l_1}, \quad x_2 = [a_2, b_2^\varphi]^{l_2}, \quad \dots, \quad x_k = [a_k, b_k^\varphi]^{l_k},$$

$$y_1 = [c_1, d_1^\varphi]^{m_1}, \quad y_2 = [c_2, d_2^\varphi]^{m_2}, \quad \dots, \quad y_k = [c_k, d_k^\varphi]^{m_k},$$

palavras de comprimento 1 em T , onde $l_j, m_j = \pm 1$, para $j = 1, \dots, k$. Sejam $t_1 = [x_1, y_1], t_2 = [x_2, y_2], \dots, t_k = [x_k, y_k]$ elementos de $\gamma_2(T)$.

Pela Proposição 4.14, segue que $t_i \in [\gamma_2(G), \gamma_2(G)^\varphi]$, e assim $t = t_1 \dots t_k \in [\gamma_2(G), \gamma_2(G)^\varphi]$.

Agora suponhamos, por indução, que se u_j, v_j são palavras em T de comprimento $r-1$ e $s-1$, respectivamente, para $j = 1, \dots, k$. Então $[u_1, v_1] \dots [u_k, v_k] \in [\gamma_2(G), \gamma_2(G)^\varphi]$.

Sejam x_j, y_j , para $j = 1, \dots, k$, palavras em T de comprimentos r e s , respectivamente. Podemos escrever,

$$x_j = u_j [a_j, b_j^\varphi], \quad y_j = v_j [c_j, d_j^\varphi],$$

onde u_j e v_j são palavras em T de comprimentos $r-1$ e $s-1$, respectivamente, nos geradores de T . Portanto,

$$\begin{aligned} t_j &= [u_j, v_j] = [u_j [a_j, b_j^\varphi], v_j [c_j, d_j^\varphi]] = \\ &= [u_j, [c_j, d_j^\varphi]]^{[a_j, b_j^\varphi]} [u_j, v_j]^{[c_j, d_j^\varphi]} [a_j, b_j^\varphi] [[a_j, b_j^\varphi], [c_j, d_j^\varphi]] [[a_j, b_j^\varphi], v_j]^{[c_j, d_j^\varphi]}. \end{aligned}$$

Mas pelo primeiro passo de indução,

$$[[a_j, b_j^\varphi], [c_j, d_j^\varphi]] \in [\gamma_2(G), \gamma_2(G)^\varphi].$$

Pela hipótese de indução,

$$[u_j, [c_j, d_j^\varphi]], [u_j, v_j], [[a_j, b_j^\varphi], v_j] \in [\gamma_2(G), \gamma_2(G)^\varphi].$$

Usando o Lema 1.2, segue que

$$t_j \in [\gamma_2(G), \gamma_2(G)^\varphi], \text{ para } j = 1, \dots, k,$$

conseqüentemente, $t = t_1 t_2 \dots t_k \in [\gamma_2(G), \gamma_2(G)^\varphi]$. Portanto,

$$\gamma_2(T) \subseteq [\gamma_2(G), \gamma_2(G)^\varphi].$$

Procedemos agora por indução sobre n , admitindo que

$$\gamma_n(T) \subseteq [\gamma_{n-1}(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi].$$

Para provarmos que $\gamma_{n+1}(T) \subseteq [\gamma_n(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi]$ usaremos indução sobre o comprimento das palavras em T .

Primeiro consideremos palavras em T de comprimento 1. Então,

$$z_{11} = [x_{11}, (x_{11}')^\varphi]^{l_{11}}, z_{12} = [x_{12}, (x_{12}')^\varphi]^{l_{12}}, \dots, z_{1(n+1)} = [x_{1(n+1)}, (x_{1(n+1}')^\varphi]^{l_{1(n+1)}}, \dots,$$

$$z_{k1} = [x_{k1}, (x_{k1}')^\varphi]^{l_{k1}}, \dots, z_{k(n+1)} = [x_{k(n+1)}, (x_{k(n+1}')^\varphi]^{l_{k(n+1)}}$$

onde $l_{ij} = \pm 1$, para todos $i = 1, \dots, k$ e $j = 1, \dots, (n+1)$.

Sejam

$$t_i = [z_{i1}, z_{i2}, \dots, z_{i(n+1)}] = [[z_{i1}, z_{i2}, \dots, z_{in}], z_{i(n+1)}],$$

$i = 1, \dots, k$, elementos de $\gamma_{n+1}(T)$. Pela hipótese de indução, $[z_{i1}, z_{i2}, \dots, z_{in}] \in [\gamma_{(n-1)}(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi]$.

Para $[z_{i1}, \dots, z_{in}] = [a, b^\varphi]$, onde $a \in \gamma_{n-1}(\gamma_2(G))$ e $b \in \gamma_2(G)$,

$$t_i = [[a, b^\varphi], z_{i(n+1)}] = [[a, b^\varphi], [x_{i(n+1)}, y_{i(n+1)}^\varphi]^{l_{i(n+1)}}]$$

e pela Proposição 4.14, segue que $t_i \in [\gamma_n(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi]$. Assim,

$$t = t_1 \dots t_k \in [\gamma_n(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi].$$

Suponhamos, por indução, que $u_{11}, \dots, u_{k(n+1)}$ são palavras em T , com $u_{i1}, u_{i2}, \dots, u_{i(n+1)}$ de comprimento $r_1 - 1, r_2 - 1, \dots, r_{n+1} - 1$, respectivamente, para $i = 1, \dots, k$, então,

$$t_1 = [u_{11}, \dots, u_{k(n+1)}], \dots, t_k = [u_{k1}, \dots, u_{k(n+1)}],$$

e $t = t_1 \dots t_k \in [\gamma_{n-1}(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi]$.

Sejam $s_{i1}, \dots, s_{i(n+1)}$ palavras em T de comprimentos $r_1, r_2, \dots, r_{n+1}$, respectivamente, para $i = 1, \dots, k$. Podemos escrever

$$s_{ij} = u_{ij}[x_{ij}, y_{ij}^\varphi], \text{ para todos } j = 1, \dots, n+1, \text{ e } i = 1, \dots, k,$$

onde u_{ij} , para $j = 1, \dots, n+1$, são palavras em T de comprimentos $r_j - 1$, respectivamente, para $i = 1, \dots, n+1$, nos geradores de T .

Sejam,

$$t_1 = [s_{11}, \dots, s_{1(n+1)}], \dots, t_k = [s_{k1} \dots s_{k(n+1)}],$$

elementos de $\gamma_{n+1}(T)$.

Temos que,

$$t_i = [s_{i1}, \dots, s_{in}, s_{i(n+1)}] = [[s_{i1}, \dots, s_{in}], s_{i(n+1)}]$$

onde $[s_{i1}, \dots, s_{in}] \in \gamma_n(T) \subseteq [\gamma_{n-1}(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi]$.

Para $[s_{i1}, \dots, s_{in}] = [a, b^\varphi]$, onde $a \in \gamma_{n-1}(\gamma_2(G))$ e $b \in \gamma_2(G)$ temos,

$$\begin{aligned} t_i &= [[a, b^\varphi], s_{i(n+1)}] = [[a, b^\varphi], u_{i(n+1)}[x_{i(n+1)}, y_{i(n+1)}^\varphi]] = \\ &= [[a, b^\varphi], [x_{i(n+1)}, y_{i(n+1)}^\varphi]][[a, b^\varphi], u_{i(n+1)}]^{[x_{i(n+1)}, y_{i(n+1)}^\varphi]}. \end{aligned}$$

Agora pela Proposição 4.14 e a hipótese de indução sobre o comprimento das palavras em T segue que $t_i \in [\gamma_n(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi]$. Um argumento de indução usando cálculo de comutadores e as relações de $\nu^q(G)$ mostram que, para qualquer $[s_{i1}, \dots, s_{in}] = [a_1, b_1^\varphi] \dots [a_m, b_m^\varphi] \in [\gamma_{n-1}(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi]$, vale:

$$t_i = [[s_{i1}, \dots, s_{in}], s_{i(n+1)}] \in [\gamma_n(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi]$$

e conseqüentemente,

$$t = t_1 t_2 \dots t_m \in [\gamma_n(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi].$$

Portanto,

$$\gamma_{n+1}(T) \subseteq [\gamma_n(\gamma_2(G)), \gamma_2(G)^\varphi]. \quad (4.5)$$

□

4.3 A Nilpotência de $G \otimes^q G$:

Consideremos G um grupo nilpotente de classe n , $Cl(G) = n$, ou seja, $\gamma_{n+1}(G) = 1$.

Segue que G' é nilpotente com $Cl(G') < n$. E para G^q seguem os mesmos resultados do grupo G .

Teorema 4.13 $G \otimes^q G$ é nilpotente com $cl(G \otimes^q G) < 2(n + 1)$.

Demonstração:

Como $Cl(G) = n$, segue que G' é nilpotente com $Cl(G') < n$ e G^q é nilpotente com $Cl(G^q) \leq n$. Portanto,

$$\gamma_{n+1}(G^q) = 1, \quad \gamma_{n+1}(G') = 1.$$

Pelas Proposições 4.15 e 4.17 segue que,

$$\gamma_{n+2}(K) \subseteq [\gamma_{n+1}(G^q), (G^q)^\varphi] = 1.,$$

$$\gamma_m(T) \subseteq [\gamma_{n+1}(G'), (G')^\varphi] = 1,$$

onde m é o menor inteiro maior ou igual a $\frac{n-1}{2}$. Ou seja, K e T são nilpotentes com classe de nilpotência no máximo $n + 1$. Também temos que K e T são subgrupos

normais de $\nu^q(G)$, então, pelo *Teorema de Fitting* (cf. Teorema 1.1), $G \otimes^q G \cong TK$ é nilpotente de classe no máximo $cl(K) + cl(T) = 2n$.

□

4.4 A Série Central Inferior de $\nu^q(G)$

Para calcularmos a série central inferior de $\nu_q(G)$ precisaremos dos seguintes resultados:

Proposição 4.18 *Em $\nu^q(G)$ vale:*

$$[K, {}_i G] \leq [\gamma_i(G), G^\varphi], \text{ para } i \geq 1.$$

Demonstração:

Usaremos indução sobre i .

Para provarmos que $[K, G] \leq [G, G^\varphi]$, usaremos indução sobre o comprimento das palavras em K .

Primeiro consideremos $\{k\} \in K$ e $g \in G$:

$$[\{k\}, g] = \{k\}^{-1} \{k\}^g = \{k\}^{-1} \{k^g\} = f(k, k^{-1}) \{k^{-1}\} \{k^g\}$$

por R_1 e R_4 .

Mas,

$$\begin{aligned} \{k^{-1}k^g\} &= \{k^{-1}\} f(k^{-1}, k^g) \{k^g\} = \\ &= \{k^{-1}\} \{k^g\} f(k^{-1}, k^g) [f(k^{-1}, k^g), \{k^g\}] \equiv \{k^{-1}\} \{k^g\} \text{ mod}(T), \end{aligned}$$

por R_3 .

Portanto,

$$[\{k\}, g] \equiv \{[k, g]\} \equiv 1 \text{ mod}(T),$$

por R_5 . Ou seja, $[\{k\}, g] \in T = [G, G^\varphi]$.

Quando consideramos $\{k\}^{-1} \in K$ e $g \in G$ analogamente segue que $[\{k\}^{-1}, g] \in T$.

Suponhamos, por indução, que se x é uma palavra em K de comprimento n e $g \in G$, então $[x, g] \in T$.

Sejam $\bar{x} = x\{z\} \in K$ e $g \in G$. Então,

$$[\bar{x}, g] = [x\{z\}, g] = [x, g]^{\{z\}}[\{z\}, g].$$

Mas pelo primeiro passo de indução $[\{z\}, g] \in T$. Pela hipótese de indução e R_3 , segue que $[x, g]^{\{z\}} \in T$, portanto, $[\bar{x}, g] \in T$, e conseqüentemente,

$$[K, G] \leq T.$$

Suponhamos, por indução sobre i , que

$$[K, {}_i G] = [K, G, \dots, G] \leq [\gamma_i(G), G^\varphi].$$

Então,

$$[K, {}_{i+1} G] = [[K, {}_i G], G] \leq [[\gamma_i(G), G^\varphi], G] = [\gamma_{i+1}(G), G^\varphi]$$

pelo Lema 1.2.

□

Analogamente, temos que $[K, {}_i G^\varphi] \leq [G, \gamma_i(G^\varphi)]$.

Proposição 4.19 *Em $\nu^q(G)$ vale:*

$$[T, {}_i K] \leq [\gamma_{i+1}(G), G^\varphi], \quad \text{para } i \geq 1.$$

Demonstração:

Usaremos indução sobre i .

Para provarmos que $[T, K] \subseteq [\gamma_2(G), G^\varphi]$ usaremos indução sobre o comprimento das palavras em K e em T .

Primeiro consideremos $\{k\} \in K$ e $[g, h^\varphi] \in T$, temos que:

$$[[g, h^\varphi], \{k\}] = [[g, h^\varphi], k^q] = [[g, h], (k^q)^\varphi] \in [\gamma_2(G), (G^q)^\varphi]. \quad (4.6)$$

Por R_4 , temos que $\{k\}^{-1} = f(k, k^{-1})\{k^{-1}\}$. Então,

$$\begin{aligned} [[g, h^\varphi], \{k\}^{-1}] &= [[g, h^\varphi], f(k, k^{-1})\{k^{-1}\}] \\ &= [[g, h^\varphi], \{k^{-1}\}][[g, h^\varphi], f(k, k^{-1})]. \end{aligned}$$

De maneira análoga à (4.6), temos que $[[g, h^\varphi], \{k^{-1}\}] \in [\gamma_2(G), (G^q)^\varphi]$. Também temos que:

$$[[g, h^\varphi], f(k, k^{-1})] \in \gamma_2(T) \subseteq [\gamma_2(G), \gamma_2(G)^\varphi] \subseteq [\gamma_2(G), G^\varphi]$$

pela Proposição 4.17.

Portanto,

$$[[g, h^\varphi], \{k\}^{e_1}] \in [\gamma_2(G), G^\varphi],$$

onde $e_1 = \pm 1$.

Agora suponhamos, por indução sobre o comprimento das palavras em K , que se $x \in K$ é uma palavra de comprimento n , vale:

$$[[g, h^\varphi], x] \in [\gamma_2(G), G^\varphi].$$

Seja $x' = x\{z\} \in K$. Então,

$$[[g, h^\varphi], x'] = [[g, h^\varphi], \{z\}][[g, h^\varphi], x]^{\{z\}}.$$

Por (4.6), segue que $[[g, h^\varphi], \{z\}] \in [\gamma_2(G), G^\varphi]$. Pela hipótese de indução e por R_3 , $[[g, h^\varphi], x]^{\{z\}} \in [\gamma_2(G), G^\varphi]$. Portanto,

$$[[g, h^\varphi], x'] \in [\gamma_2(G), G^\varphi].$$

Se considerarmos $[g, h^\varphi]^{-1} \in T$, de acordo com a Proposição 1.10,

$$[g, h^\varphi]^{-1} = [g^{-1}, h^\varphi]^g = [(g^{-1})^g, (h^g)^\varphi],$$

e de maneira análoga,

$$[[g, h^\varphi]^{-1}, k] \in [\gamma_2(G), (G^q)^\varphi], \text{ para } k \in K.$$

Suponhamos, por indução, que para qualquer palavra $t \in T$, de comprimento n , vale:

$$[t, k] \in [\gamma_2(G), (G^q)^\varphi], \text{ para } k \in K.$$

Seja $t' = t[g, h^\varphi]$ uma palavra em T de comprimento $n + 1$. Então,

$$[t', k] = [t[g, h^\varphi], k] = [t, k]^{[g, h^\varphi]} [[g, h^\varphi], k].$$

Pelo primeiro passo de indução, Lema 1.2 e pela hipótese de indução, segue que:

$$[t', k] \in [\gamma_2(G), (G^q)^\varphi].$$

Portanto,

$$[T, K] \subseteq [\gamma_2(G), (G^q)^\varphi].$$

Agora suponhamos, por indução, que:

$$[T,_{(n-1)} K] \subseteq [\gamma_n(G), (G^q)^\varphi].$$

Então,

$$\begin{aligned} [T,_{n} K] &= [[T,_{(n-1)} K], K] \subseteq [[\gamma_n(G), G^\varphi], K] = \\ &= [\gamma_n(G), G^\varphi, G^q] = [\gamma_n(G), G, (G^q)^\varphi] = [\gamma_{n+1}(G), (G^q)^\varphi]. \end{aligned}$$

□

Proposição 4.20 *Em $\nu^q(G)$ vale:*

$$\gamma_i(\nu^q(G)) \leq \gamma_i(G)\gamma_i(G^\varphi)\gamma_{i-1}(K)T, \text{ para } i \geq 2.$$

Demonstração:

Para $i = 2$,

$$\begin{aligned}\gamma_2(\nu^q(G)) &= [\nu^q(G), \nu^q(G)] = [(TK \rtimes G) \rtimes G^\varphi, (TK \rtimes G) \rtimes G^\varphi] \leq \\ &\leq \gamma_2(G)\gamma_2(G^\varphi)TK\end{aligned}$$

pelas relações definidoras de $\nu^q(G)$, pela normalidade de TK e pela Proposição 1.1.

Suponhamos, por indução sobre $i \geq 2$, que,

$$\gamma_i(\nu^q(G)) \leq \gamma_i(G)\gamma_i(G^\varphi)\gamma_{i-1}(K)T.$$

Então,

$$\begin{aligned}[\gamma_i(\nu^q(G)), G] &\leq \gamma_{i+1}(G)[G, \gamma_i(G^\varphi)][\gamma_{i-1}(K), G][T, K] \leq \\ &\leq \gamma_{i+1}(G)[G, \gamma_i(G^\varphi)]T[\gamma_2(G), (G^q)^\varphi] = \gamma_{i+1}(G)T.\end{aligned}$$

Por simetria, segue que:

$$[\gamma_i(\nu^q(G)), G^\varphi] \leq \gamma_{i+1}(G^\varphi)T.$$

Também temos que:

$$\begin{aligned}[\gamma_i(\nu^q(G)), K] &\leq [\gamma_i(G), K][\gamma_i(G^\varphi), K]\gamma_i(K)[T, K] \leq \\ &[\gamma_i(G), G^\varphi][G, \gamma_i(G^\varphi)]\gamma_i(K)[\gamma_2(G), (G^q)^\varphi]\end{aligned}$$

pela Proposição 4.18,

$$= [G, \gamma_i(G^\varphi)]\gamma_i(K).$$

E,

$$\begin{aligned}[\gamma_i(\nu^q(G)), T] &\leq [\gamma_i(G), T][\gamma_i(G^\varphi), T][\gamma_{i-1}(K), T]\gamma_2(T) \leq \\ &\leq [\gamma_{i+1}(G), G^\varphi][G, \gamma_{i+1}(G^\varphi)][\gamma_i(G), (G^q)^\varphi]\gamma_2(T).\end{aligned}$$

Portanto,

$$\gamma_{i+1}(\nu^q(G)) \leq \gamma_{i+1}(G)\gamma_{i+1}(G^\varphi)\gamma_i(K)T.$$

□

4.5 A Nilpotência de $\nu^q(G)$

Consideremos G um grupo nilpotente de classe n , ou seja, $\gamma_{n+1}(G) = 1$ e $\gamma_{n+1}(G^\varphi) = 1$. Portanto, pelas Proposições 4.15 e 4.17, $\gamma_{n+2}(K) = 1$ e $\gamma_m(T) = 1$, onde m é o menor inteiro positivo maior ou igual a $\frac{n-1}{2}$.

Pela Proposição 4.20, $\gamma_{n+3}(\nu^q(G)) \leq T$.

Pela proposição 4.18, $[K,_{(n+1)}G] = 1$, ou seja, G age nilpotentemente sobre K de classe $n + 1$. E pela Proposição 4.19, $[T, _nK] = 1$, ou seja K age nilpotentemente sobre T de classe n .

Sob estas hipóteses temos o seguinte resultado:

Proposição 4.21 $\nu^q(G)$ é nilpotente.

Demonstração:

Primeiro observamos que:

$$[\gamma_{n+3}(\nu^q(G)), G] \leq [T, G] \leq [\gamma_2(G), G^\varphi],$$

$$[\gamma_{n+3}(\nu^q(G)), G^\varphi] \leq [G, \gamma_2(G^\varphi)],$$

$$[\gamma_{n+3}(\nu^q(G)), K] \leq [T, K] \leq [\gamma_2(G), (G^q)^\varphi],$$

pela Proposição 4.19,

$$[\gamma_{n+3}(\nu^q(G)), T] \leq \gamma_2(T) \leq [\gamma_2(G), \gamma_2(G^\varphi)],$$

pela Proposição 4.16.

E assim,

$$\gamma_{n+4}(\nu^q(G)) \leq [\gamma_2(G), G^\varphi][G, \gamma_2(G^\varphi)][T, K]\gamma_2(T).$$

Suponhamos, por indução, que

$$\gamma_{(n+3)+i}(\nu^q(G)) \leq [\gamma_{i+1}(G), G^\varphi][G, \gamma_{i+1}(G^\varphi)][T, _iK]\gamma_{i+1}(T).$$

Então,

$$[\gamma_{(n+3)+i}(\nu^q(G)), G] \leq [\gamma_{i+2}(G), G^\varphi][G, \gamma_{i+2}(G^\varphi)], \quad (4.7)$$

pois $[T, {}_i K, G] \leq [[\gamma_{i+2}(G), G^\varphi]]$, pela Proposição 4.19, e $[\gamma_{i+1}(T), G] \leq [[\gamma_i(G')], G] \leq [G, \gamma_{i+2}(G^\varphi)]$.

Analogamente,

$$[\gamma_{(n+3)+i}(\nu^q(G)), G^\varphi] \leq [\gamma_{i+2}(G), G^\varphi][G, \gamma_{i+2}(G^\varphi)]. \quad (4.8)$$

Agora,

$$\begin{aligned} [\gamma_{(n+3)+i}(\nu^q(G)), K] &\leq [\gamma_{i+1}(G), G^\varphi, K][G, \gamma_{i+1}(G^\varphi), K][T, {}_{i+1} K][\gamma_{i+1}(T), K] \leq \\ &\leq [\gamma_{i+2}(G), G^\varphi][G, \gamma_{i+2}(G^\varphi)][T, {}_{i+1} K], \end{aligned} \quad (4.9)$$

pela Proposição 4.16.

Também temos que,

$$\begin{aligned} [\gamma_{(n+3)+i}(\nu^q(G)), T] &\leq [\gamma_{i+1}(G), G^\varphi, T][G, \gamma_{i+2}(G^\varphi), K]\gamma_{i+2}(T) \leq \\ &\leq [\gamma_{i+2}(G), G^\varphi]\gamma_{i+2}(T). \end{aligned} \quad (4.10)$$

Por (4.7), (4.8), (4.9) e (4.10) segue que,

$$\gamma_{(n+3)+(i+1)}(\nu^q(G)) \leq [\gamma_{i+2}(G), G^\varphi][G, \gamma_{i+2}(G^\varphi)][T, {}_{i+1} K]\gamma_{i+2}(T).$$

Portanto,

$$\gamma_{(n+3)+m}(\nu^q(G)) \leq [\gamma_{m+1}(G), G^\varphi][G, \gamma_{m+1}(G^\varphi)][T, {}_m K]\gamma_{m+1}(T), \text{ para } m \geq 1.$$

Como, G é nilpotente de classe n , temos que,

$$\gamma_{n+1}(G) = \gamma_{n+1}(G^\varphi) = 1,$$

$$[T, {}_n K] = 1,$$

$$\gamma_{n+2}(T) = 1.$$

Portanto,

$$\gamma_{2n+4}(\nu^q(G)) = 1,$$

ou seja, $\nu^q(G)$ é nilpotente, de classe no máximo $2n + 4$.

□

4.6 O Grupo $\nu^q(G)$ de um Grupo Nilpotente Finito

Sejam $N \trianglelefteq G$ e $\bar{G} = G/N$. O epimorfismo canônico $\pi : G \rightarrow \bar{G}$ dá origem ao epimorfismo:

$$\begin{aligned} \tilde{\pi} : \nu^q(G) &\longrightarrow \nu^q(\bar{G}) \\ g &\longmapsto \bar{g} \\ g^\varphi &\longmapsto \bar{g}^\varphi \\ \{k\} &\longmapsto \{\bar{k}\} \end{aligned} \tag{4.11}$$

onde $\bar{g}^\varphi = \overline{g^\varphi}$.

Sob estas hipóteses temos o seguinte resultado.

Proposição 4.22

- (i) $[N, G^\varphi].K \trianglelefteq \nu^q(G)$ e $[G, N^\varphi].K \trianglelefteq \nu^q(G)$
- (ii) $\ker(\tilde{\pi}) = \langle N, N^\varphi, \{N\} \rangle.[N, G^\varphi].[G, N^\varphi]$, onde $\{N\} = \{\{n\} \mid n \in N\}$ (levantamento de N)

Demonstração:

- (i) Sejam $n \in N$, $g, k, w \in G$, então:

$$[n, g^\varphi]^w = [n^w, (g^w)^\varphi] \in [N, G^\varphi],$$

ou seja, G normaliza $[N, G^\varphi]$.

Analogamente G^φ normaliza $[N, G^\varphi]$.

Também temos que:

$$[n, g^\varphi]^{\{k\}} = [n^{k^q}, (g^{k^q})^\varphi] \in [N, G^\varphi],$$

que implica que K também normaliza $[N, G^\varphi]$.

Portanto $[N, G^\varphi] \trianglelefteq \nu^q(G)$, e como $K \trianglelefteq \nu^q(G)$, segue que $[N, G^\varphi].K \trianglelefteq \nu^q(G)$.

(ii) Temos que:

$$\ker(\tilde{\pi}) = \{m \in \nu^q(G) \mid \tilde{\pi}(m) = 1_{\nu^q(\bar{G})}\}.$$

Consideremos o seguinte subgrupo de $\nu^q(G)$: $M = \langle N, N^\varphi, \{N\} \rangle [N, G^\varphi] [G, N^\varphi]$. Levando em conta as relações definidoras de $\nu^q(G)$, verificamos que $M \leq \ker(\tilde{\pi})$ e $M \trianglelefteq \nu^q(G)$.

Seja,

$$\begin{aligned} \theta : \bar{G} \cup \bar{G}^\varphi \cup \bar{K} &\longrightarrow \nu^q(G)/M \\ \bar{g} &\longmapsto Mg \\ \bar{g}^\varphi &\longmapsto Mg^\varphi \\ \{\bar{k}\} &\longmapsto M\{k\} \end{aligned} \tag{4.12}$$

As restrições de θ a $\bar{G}$, $\bar{G}^\varphi$ e $\bar{K}$ são homomorfismos, portanto existe um único homomorfismo θ^* que estende θ ao produto livre $\bar{G} * \bar{G}^\varphi * \bar{K}$.

Temos que as relações R e S são preservadas por θ^* . Conseqüentemente θ induz um homomorfismo:

$$\tilde{\theta} : \nu^q(\bar{G}) \longrightarrow \nu^q(G)/M$$

e como $M \leq \ker(\tilde{\pi})$, obtemos um epimorfismo:

$$\bar{\pi} : \nu^q(G)/M \longrightarrow \nu^q(\bar{G}) \tag{4.13}$$

e assim podemos construir o seguinte diagrama:

tal que:

$$\begin{aligned} \bar{\pi} : Mg &\longmapsto \bar{g} \\ \bar{M}g^\varphi &\longmapsto \bar{g}^\varphi \\ M\{k\} &\longmapsto \{\bar{k}\} \end{aligned} \tag{4.14}$$

Então:

$$\begin{aligned} \bar{\pi}\tilde{\theta} : \nu^q(\bar{G}) &\longrightarrow \nu^q(\bar{G}) \\ \bar{g} &\longmapsto \bar{g} \\ \bar{g}^\varphi &\longmapsto \bar{g}^\varphi \\ \{\bar{k}\} &\longmapsto \{\bar{k}\} \end{aligned} \tag{4.15}$$

Ou seja,

$$\bar{\pi}\tilde{\theta} = 1_{\nu^q(G)}$$

e assim $\tilde{\theta}$ é um isomorfismo.

Portanto $M = \ker(\tilde{\pi})$.

□

Nos resultados a seguir generalizamos alguns resultados semelhantes aos obtidos por *Rocco* em [20].

Proposição 4.23 *Sejam N e H subgrupos normais de G tais que $G = N \times H$.*

Então:

- (i) $\nu^q(G) \cong \langle N, N^\varphi, \{N\} \rangle \cdot [N, H^\varphi] \cdot [H, N^\varphi] \cdot \langle H, H^\varphi, \{H\} \rangle$;
- (ii) $\nu^q(H) \cong \langle H, H^\varphi, \{H\} \rangle$ e $\nu^q(N) \cong \langle N, N^\varphi, \{N\} \rangle$.

Demonstração:

- (i) Temos que $G/N \cong H$, $\tilde{\pi} : \nu^q(G) \rightarrow \nu^q(H)$, e

$$\ker(\tilde{\pi}) = \langle N, N^\varphi, \{N\} \rangle [G, N^\varphi] [N, G^\varphi] \tag{4.16}$$

pela Proposição 4.22.

Pelo isomorfismo (2.24), temos que:

$$\nu^q(G) = \nu^q(NH) \cong ([NH, N^\varphi H^\varphi] \langle \{NH\} \rangle \rtimes NH) \rtimes N^\varphi H^\varphi,$$

onde,

$$[NH, N^\varphi H^\varphi] = [N, N^\varphi] [N, H^\varphi] [H, N^\varphi] [H, H^\varphi],$$

e pelo conjunto de relações R_4 de $\nu^q(G)$,

$$\langle \{NH\} \rangle \equiv \langle \{N\} \rangle \langle \{H\} \rangle \text{ mod } [N, H^\varphi] [H, N^\varphi].$$

Portanto, podemos reescrever $\nu^q(G)$ da seguinte maneira,

$$\nu^q(G) \cong \langle N, N^\varphi, \{N\} \rangle [N, H^\varphi] [H, N^\varphi] \langle H, H^\varphi, \{H\} \rangle. \quad (4.17)$$

(ii) Temos que,

$$\nu^q(G) / \ker(\tilde{\pi}) \cong \nu^q(H).$$

Mas por (4.16) e pelo isomorfismo (4.17), segue que,

$$\nu^q(H) \cong \langle H, H^\varphi, \{H\} \rangle.$$

Se considerarmos $G/H \cong N$, analogamente obtemos

$$\nu^q(N) \cong \langle N, N^\varphi, \{N\} \rangle.$$

□

De acordo com a proposição anterior, temos que:

$$\nu^q(G) = \nu^q(N) [N, H^\varphi] [H, N^\varphi] \nu^q(H).$$

Agora consideremos G um grupo nilpotente finito, $G = P_1 \times P_2 \times \dots \times P_n$, onde $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ é o conjunto de p_i -subgrupos de Sylow de G .

Para qualquer primo $p \mid |G|$, seja P um p -subgrupo de Sylow de G e N um p -complemento normal de P em G .

Temos que: $[N, P^\varphi] = [P, N^\varphi] = 1$, pelo Lema 1.3 (cf.[17]). Daí,

$$\nu^q(G) = \nu^q(P) \times \nu^q(N). \quad (4.18)$$

Portanto, por indução, segue o resultado:

$$\nu^q(G) = \nu^q(P_1) \times \nu^q(P_2) \times \dots \times \nu^q(P_n). \quad (4.19)$$

Capítulo 5

O Quadrado q -Tensorial de Grupos Nilpotentes de Classe 2 Finitamente Gerados

Neste capítulo descrevemos uma apresentação mais conveniente para o grupo $\nu^q(G)$, quando G é um grupo nilpotente n -gerado de classe 2, a qual traz vantagens computacionais significativas tendo em vista o número reduzido de relações.

Consideremos $G = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ um grupo nilpotente de classe 2 e $G^\varphi = \langle x_1^\varphi, x_2^\varphi, \dots, x_n^\varphi \rangle$, isomorfo a G através do isomorfismo $\varphi : g \mapsto g^\varphi, \forall g \in G$.

Proposição 5.24 *Sob as hipóteses acima, temos*

- (i) $T = [G, G^\varphi]$ é abeliano.
- (ii) $[G', (G')^\varphi] = 1$

Demonstração:

- (i) Sejam $[g_1, g_2^\varphi], [g, h^\varphi] \in T$. Pelo Lema 1.2, temos que

$$[g_1, g_2^\varphi]^{[g, h^\varphi]} = [g_1, g_2^\varphi]^{[g, h]} = [g_1^{[g, h]}, g_2^{[g, h]^\varphi}] = [g_1, g_2^\varphi],$$

pois $G' \leq Z(G)$.

Portanto T é abeliano.

(ii) Sejam $[a_1, a_2], [b_1, b_2] \in G'$. Então, pela Proposição 1.10,

$$[[a_1, a_2], [b_1, b_2]^\varphi] = [[a_1, a_2^\varphi], [b_1, b_2^\varphi]] = 1.$$

Portanto, como G é de classe 2 e pelas propriedades de comutadores segue que $[G', (G')^\varphi] = 1$

□

Sejam $S_1', S_2', R_1', R_2', R_3', R_5'$ e R_6' as relações correspondentes a $S_1, S_2, R_1, R_2, R_3, R_5$ e R_6 , de $\nu^q(G)$, consideradas para todo $g_1, g_2, k, k' \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e $g^\varphi, g_2^\varphi \in \{x_1^\varphi, x_2^\varphi, \dots, x_n^\varphi\}$.

Teorema 5.14 *As relações $S_1, S_2, R_1, R_2, R_3, R_5$ e R_6 podem ser obtidas de $S_1', S_2', R_1', R_2', R_3', R_5'$ e R_6' .*

Demonstração: Suponhamos que $S_1', S_2', R_1', R_2', R_3', R_5'$ e R_6' são válidas.

Pela solubilidade de G vale a Proposição 3.13. Portanto, as relações S_1 e S_2 podem ser obtidas de S_1' e S_2' . Consideremos separadamente (caso a caso) as demais relações.

(i) $R_1: \{k\}^g = \{k^g\}, \forall k, g \in G$.

A Proposição 3.13 garante que a identidade $\{k\}^g = \{k^g\}$ decorre das identidades $\{k\}^{x_i} = \{k^{x_i}\}, \forall k \in G$ e $i = 1, \dots, n$. Sendo assim restamos provar a validade de R_1 a partir das identidades $\{x_i\}^g = \{x_i^g\}, \forall i = 1, \dots, n$ e $\forall g \in G$. Para tanto começaremos estabelecendo alguns resultados preliminares.

Recordamos que de acordo com a notação estabelecida no Capítulo 2, temos que se $y, z \in G$, então

$$f(y, z) = \prod_{i=1}^{q-1} [y^{-1}, (z^{iy^{1-q+i}})^\varphi] \in [G, G^\varphi].$$

Segue direto da definição que se $y, z, g \in G$, então $f(y, z)^g = f(y^g, z^g)$.

Lema 5.5 *Para todo $m \in \mathbb{N}$ e $i = 1, \dots, n$, temos que,*

- (i) $\{x_i^m\} = \{x_i\}^m [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{m}{2} \binom{q}{2}}$;
(ii) $\{x_i^{-m}\} = \{x_i\}^{-m} [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{m+1}{2} \binom{q}{2}}$.

Demonstração:

- (i) Usaremos indução sobre m .

O caso $m = 1$ segue direto. Se $m = 2$, por R_4 temos que:

$$\{x_i^2\} = \{x_i\} f(x_i, x_i) \{x_i\}.$$

Por R_3' , pela Proposição 3.13, e como $f(x_i, x_i) = [x_i, x_i^\varphi] \binom{q}{2}$ pelo Lema 1.4, segue que:

$$\begin{aligned} \{x_i^2\} &= \{x_i\} [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{q}{2}} \{x_i\} = \{x_i\} \{x_i\} [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{q}{2}} \{x_i\} = \\ &= \{x_i\}^2 [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{q}{2} x_i^q} = \{x_i\}^2 [x_i^{x_i^q}, (x_i^{x_i^q})^\varphi]^{-\binom{q}{2} x_i^q} = \{x_i\}^2 [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{q}{2}}. \end{aligned}$$

Agora suponhamos que,

$$\{x_i^{(m-1)}\} = \{x_i\}^{(m-1)} [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{(m-1)}{2} \binom{q}{2}}.$$

Então,

$$\begin{aligned} \{x_i^m\} &= \{x_i^{(m-1)} x_i\} = \{x_i^{(m-1)}\} f(x_i^{(m-1)}, x_i) \{x_i\} \\ &= \{x_i^{(m-1)}\} [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{(m-1)}{2} \binom{q}{2}} [x_i, x_i^\varphi]^{-(m-1) \binom{q}{2}} \{x_i\} \\ &= \{x_i\}^{(m-1)} [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{m}{2} \binom{q}{2}} \{x_i\} \\ &= \{x_i\}^m [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{m}{2} \binom{q}{2}}. \end{aligned}$$

- (ii) Também usaremos indução sobre m .

Se $m = 1$, então,

$$\{x_i^{-1}\} = f(x_i, x_i^{-1}) \{x_i\}^{-1} = f(x_i, x_i) \{x_i\}^{-1} =$$

por R_4 ,

$$= \{x_i\}^{-1} f(x_i, x_i) = \{x_i\}^{-1} [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{q}{2}}.$$

Suponhamos, por indução, que

$$\{x_i^{-m}\} = \{x_i\}^{-m} [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{m+1}{2} \binom{q}{2}}.$$

Então,

$$\begin{aligned} \{x_i^{-(m+1)}\} &= \{x_i^{-m} x_i^{-1}\} = \{x_i^{-m}\} f(x_i^{-m}, x_i^{-1}) \{x_i^{-1}\} = \\ &= \{x_i\}^{-m} [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{m+1}{2} \binom{q}{2}} [x_i, x_i^\varphi]^{-m \binom{q}{2}} \{x_i\}^{-1} [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{q}{2}} \end{aligned}$$

pele Lema 1.4 e pela hipótese de indução,

$$= \{x_i\}^{-(m+1)} [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{m+2}{2} \binom{q}{2}},$$

segundo assim o resultado desejado. □

Lema 5.6 $\{x_i^m\}^g = \{(x_i^m)^g\}$, $\forall m \in \mathbb{Z}$, $\forall g \in G$ e $\forall i = 1, \dots, n$.

Demonstração:

Seja $m \in \mathbb{N}$, então,

$$\{x_i^m\} = \{x_i\}^m [x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{m}{2} \binom{q}{2}}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \{x_i^m\}^g &= (\{x_i^m\})^g ([x_i, x_i^\varphi]^{-\binom{m}{2} \binom{q}{2}})^g \\ &= \{x_i^g\}^m [x_i^g, (x_i^g)^\varphi]^{-\binom{m}{2} \binom{q}{2}} = \\ &= \{(x_i^g)^m\} = \{(x_i^m)^g\}. \end{aligned}$$

O caso em que m é um inteiro negativo, segue de maneira análoga. □

Lema 5.7 $\{[x_i, x_j]^l\} = \{[x_i, x_j]\}^l$, onde $1 \leq i < j \leq n$ e $\forall l \in \mathbb{Z}$.

Demonstração:

Primeiro consideraremos $l \in \mathbb{N}$.

Usaremos indução sobre l . Se $l = 2$,

$$\{[x_i, x_j]^2\} = \{[x_i, x_j]\}f([x_i, x_j], [x_i, x_j])\{[x_i, x_j]\} = \{[x_i, x_j]\}^2,$$

pela Observação 1.3.

Agora suponhamos que: $\{[x_i, x_j]^l\} = \{[x_i, x_j]\}^l$. Então,

$$\begin{aligned} \{[x_i, x_j]^{(l+1)}\} &= \{[x_i, x_j]^l[x_i, x_j]\} \\ &= \{[x_i, x_j]^l\}f([x_i, x_j]^l, [x_i, x_j])\{[x_i, x_j]\} = \{[x_i, x_j]\}^{(l+1)}. \end{aligned}$$

O caso em l é um inteiro negativo, segue de maneira análoga. □

Lema 5.8 $\{[x_i, x_j]^l\}^g = \{[x_i, x_j]^{lg}\}$, $1 \leq i < j \leq n$ e $\forall g \in G$ e $l \in \mathbb{Z}$.

Demonstração:

Consideraremos o caso em que $l \in \mathbb{N}$, pois o caso em que l é um inteiro negativo segue de maneira inteiramente análoga.

Usaremos indução sobre l .

Se $l = 2$,

$$\begin{aligned} \{[x_i, x_j]^2\}^g &= (\{[x_i, x_j]\}^g)^2 = (([x_i, x_j]^g)^g)^2 = ([x_i^g, (x_j^g)^g]^g)^2 \\ &= \{[x_i^g, x_j^g]\}^2 = \{[x_i, x_j]^g\}^2 = \{[x_i, x_j]^2\} = \{[x_i, x_j]^2\}^g. \end{aligned}$$

Agora suponhamos que: $\{[x_i, x_j]^{(l-1)}\}^g = \{[x_i, x_j]^{(l-1)g}\}$. Então,

$$\begin{aligned} \{[x_i, x_j]^l\}^g &= \{[x_i, x_j]^{(l-1)}[x_i, x_j]\}^g = \{[x_i, x_j]^{(l-1)}\}^g\{[x_i, x_j]\}^g \\ &= \{[x_i, x_j]^{(l-1)g}\}\{[x_i, x_j]^g\} = \{[x_i, x_j]^{lg}\}. \end{aligned}$$

O que prova o lema. □

Para concluir a validade de R_1 usaremos indução sobre n .

Primeiro suponhamos que $n = 2$, ou seja $G = \langle x_1, x_2 \rangle$, e consideremos $g \in G$. Então $g = x_1^{m_1}x_2^{m_2}[x_1, x_2]^{l_{12}}$, onde $m_1, m_2, l_{12} \in \mathbb{Z}$. Então,

$$\{(x_1^{m_1}x_2^{m_2}[x_1, x_2]^{l_{12}})\}^g = \{(x_1^{m_1}x_2^{m_2})([x_1, x_2]^{l_{12}})\}^g$$

$$\begin{aligned}
&= \{x_1^{m_1} x_2^{m_2}\}^g f(x_1^{m_1} x_2^{m_2}, [x_1, x_2]^{l_{12}})^g \{[x_1, x_2]^{l_{12}}\}^g \\
&= \{x_1^{m_1}\}^g f(x_1^{m_1}, x_2^{m_2})^g \{x_2^{m_2}\}^g f(x_1^{m_1} x_2^{m_2}, [x_1, x_2]^{l_{12}})^g \{[x_1, x_2]^{l_{12}g}\} \\
&= \{(x_1^g)^{m_1}\} f((x_1^g)^{m_1}, (x_2^g)^{m_2}) \{(x_2^g)^{m_2}\} f((x_1^{m_1} x_2^{m_2})^g, [x_1, x_2]^{l_{12}g}) \{[x_1, x_2]^{l_{12}g}\}
\end{aligned}$$

por R_4 ,

$$\begin{aligned}
&= \{(x_1^g)^{m_1} (x_2^g)^{m_2}\} f((x_1^{m_1} x_2^{m_2})^g, ([x_1, x_2]^{l_{12}})^g) \{([x_1, x_2]^{l_{12}})^g\} \\
&\{(x_1^{m_1} x_2^{m_2})^g ([x_1, x_2]^{l_{12}})^g\} = \{(x_1^{m_1} x_2^{m_2} [x_1, x_2]^{l_{12}})^g\}.
\end{aligned}$$

Agora suponhamos, por indução, que para todo grupo nilpotente de classe e $(n - 1)$ -gerado o resultado seja verdadeiro. Consideremos G n -gerado por $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Se $k \in G$, então

$$k = \prod_{i=1}^n x_i^{m_i} \prod_{1 \leq j < k \leq n} [x_j, x_k]^{l_{jk}},$$

onde $m_i, l_{jk} \in \mathbb{Z}$.

Como $G' \leq Z(G)$, podemos reescrever k da seguinte maneira: $k = hs$, com

$$h = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{m_i} \prod_{1 \leq j < k \leq n-1} [x_j, x_k]^{l_{jk}}$$

e

$$s = x_n^{m_n} [x_{n-1}, x_n]^{l_{(n-1)n}}$$

onde $h \in H = \langle x_1, \dots, x_{n-1} \rangle$, e podemos usar a hipótese de indução, ou seja,

$$\{h\}^g = \{h^g\}$$

e $s \in S = \langle x_{n-1}, x_n \rangle$, e pelo primeiro passo de indução:

$$\{s\}^g = \{s^g\}.$$

Portanto,

$$\{k\}^g = \{hs\}^g = \{h\}^g f(h, s)^g \{s\}^g = \{h^g\} f(h^g, s^g) \{s^g\} = \{(hs)^g\} = \{k^g\}.$$

(iii) $R_2 : \{k\}^{g^\varphi} = \{k^g\}$

Este caso segue de maneira análoga ao caso anterior.

(iv) $R_3 : [g_1, g_2^\varphi]^{\{k\}} = [g_1^{k^g}, (g_2^{k^g})^\varphi]$

A Proposição 3.13 garante que a identidade $[g_1, g_2^\varphi]^{\{k\}} = [g_1^{k^g}, (g_2^{k^g})^\varphi]$ decorre das identidades $[x_i, x_j^\varphi]^{\{k\}} = [x_i^{k^g}, (x_j^{k^g})^\varphi]$, $\forall k \in G$ e $\forall i, j = 1, \dots, n$. Sendo assim resta-nos provar a validade de R_3 a partir das identidades $[g_1, g_2^\varphi]^{\{x_i\}} = [g_1^{x_i^g}, (g_2^{x_i^g})^\varphi]$, $\forall i = 1, \dots, n$ e $\forall g \in G$.

Usaremos indução sobre n .

Primeiro suponhamos que $n = 2$, ou seja $G = \langle x_1, x_2 \rangle$, e consideremos $g \in G$. Então $g = x_1^{m_1} x_2^{m_2} [x_1, x_2]^{l_{12}}$, onde $m_1, m_2, l_{12} \in \mathbb{Z}$.

Temos que:

$$\begin{aligned} \{k\} &= \{(x_1^{m_1} x_2^{m_2}) [x_1, x_2]^{l_{12}}\} \\ &= \{(x_1^{m_1} x_2^{m_2})\} f(x_1^{m_1} x_2^{m_2}, [x_1, x_2]^{l_{12}}) \{[x_1, x_2]^{l_{12}}\} \\ &= \{x_1^{m_1}\} f(x_1^{m_1}, x_2^{m_2}) \{x_2^{m_2}\} f(x_1^{m_1} x_2^{m_2}, [x_1, x_2]^{l_{12}}) \{[x_1, x_2]^{l_{12}}\} \\ &= \{x_1\}^{m_1} [x_1, x_1^\varphi]^{-\binom{m_1}{2} \binom{g}{2}} f(x_1^{m_1}, x_2^{m_2}) \{x_2\}^{m_2} \\ &\quad [x_2, x_2^\varphi]^{-\binom{m_2}{2} \binom{g}{2}} f(x_1^{m_1} x_2^{m_2}, [x_1, x_2]^{l_{12}}) [x_1, x_2^\varphi]^{q l_{12}} \end{aligned}$$

pois R_6' é válida e portanto chegamos à igualdade:

$$\{k\} = \{x_1\}^{m_1} h_1 \{x_2\}^{m_2} h_2,$$

onde $h_1, h_2 \in T = [G, G^\varphi]$.

Portanto,

$$[g_1, g_2^\varphi]^{\{k\}} = [g_1, g_2^\varphi]^{\{x_1\}^{m_1} h_1 \{x_2\}^{m_2} h_2}$$

$$\begin{aligned}
&= [g_1^{(x_1^q)^{m_1}}, (g_2^{(x_1^q)^{m_1}})^\varphi]_{h_1\{x_2\}^{m_2}h_2} \\
&= [g_1^{(x_1^{m_1})^q}, (g_2^{(x_1^{m_1})^q})^\varphi]_{h_1\{x_2\}^{m_2}h_2} \\
&= [g_1^{(x_1^{m_1})^q}, (g_2^{(x_1^{m_1})^q})^\varphi]_{\{x_2\}^{m_2}h_2} =
\end{aligned}$$

pela Proposição 1.10,

$$= [g_1^{(x_1^{m_1})^q(x_2^{m_2})^q}, (g_2^{(x_1^{m_1})^q(x_2^{m_2})^q})^\varphi].$$

Mas $(x_1^{m_1})^q(x_2^{m_2})^q = (x_1^{m_1}x_2^{m_2})^qh'$, onde $h' \in G'$. Portanto,

$$\begin{aligned}
[g_1, g_2^\varphi]^{\{k\}} &= [g_1^{(x_1^{m_1}x_2^{m_2})^qh'}, (g_2^{(x_1^{m_1}x_2^{m_2})^qh'})^\varphi] \\
&= [g_1^{(x_1^{m_1}x_2^{m_2})^q}, (g_2^{(x_1^{m_1}x_2^{m_2})^q})^\varphi] \\
&= [g_1^{(x_1^{m_1}x_2^{m_2}[x_1, x_2]^{l_{12}})^q}, (g_2^{(x_1^{m_1}x_2^{m_2}[x_1, x_2]^{l_{12}})^q})^\varphi] \\
&= [g_1^{k^q}, (g_2^{k^q})^\varphi].
\end{aligned}$$

Agora suponhamos que para todo grupo $(n-1)$ -gerado o resultado seja válido e consideremos G n -gerado pelo conjunto $\{x_1, \dots, x_n\}$.

Seja,

$$k = \prod_{i=1}^n x_i^{m_i} \prod_{1 \leq j < k \leq n} [x_j, x_k]^{l_{jk}}.$$

Podemos reescrever k da seguinte maneira: $k = hs$, com

$$h = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{m_i} \prod_{1 \leq j < k \leq n-1} [x_j, x_k]^{l_{jk}}$$

e

$$s = x_n^{m_n} [x_{n-1}, x_n]^{l_{(n-1)n}}$$

onde $h \in H = \langle x_1, \dots, x_{n-1} \rangle$, e podemos usar a hipótese de indução, ou seja,

$$[g_1, g_2^\varphi]^{\{h\}} = [g_1^{h^q}, (g_2^{h^q})^\varphi].$$

Também temos que s é um elemento do grupo 2-gerado $\langle x_{n-1}, x_n \rangle$ e portanto podemos usar o primeiro passo de indução.

Seque que:

$$\begin{aligned} [g_1, g_2^\varphi]^{\{k\}} &= [g_1, g_2^\varphi]^{\{h\}f(h,s)\{s\}} = [g_1^{g^q}, (g_2^{h^q})^\varphi]^{f(h,s)\{s\}} \\ &= [g_1^{h^q}, (g_2^{h^q})^\varphi]^{\{s\}} = [g_1^{h^q s^q}, (g_2^{h^q s^q})^\varphi] \end{aligned}$$

pois $f(h, s) \in T = [G, G^\varphi]$, e T é abeliano.

$$= [g_1^{(hs)^q}, (g_2^{(hs)^q})^\varphi] = [g_1^{k^q}, (g_2^{k^q})^\varphi].$$

$$(v) \quad R_6 : \{[g_1, g_2]\} = [g_1, g_2^\varphi]^q$$

Usaremos indução sobre n .

Primeiro suponhamos que $n = 2$, ou seja $G = \langle x_1, x_2 \rangle$, e consideremos $g_1, g_2 \in G$. Então, $g_1 = x_1^{m_1} x_2^{m_2} [[x_1, x_2]^{l_{12}}]$, $g_2 = x_1^{s_1} x_2^{s_2} [[x_1, x_2]^{t_{12}}]$ onde $m_1, m_2, l_{12}, s_1, s_2, t_{12} \in \mathbb{Z}$.

Temos que:

$$\begin{aligned} \{[g_1, g_2]\} &= \{[x_1^{m_1} x_2^{m_2} [x_1, x_2]^{l_{12}}, x_1^{s_1} x_2^{s_2} [x_1, x_2]^{t_{12}}]\} \\ &= \{[x_1^{m_1} x_2^{m_2}, x_1^{s_1} x_2^{s_2}]\} \end{aligned}$$

pois $G' \in Z(G)$.

$$\begin{aligned} &= \{[x_1^{m_1}, x_2^{s_2}][x_2^{m_2}, x_1^{s_1}]\} = \{[x_1, x_2]^{m_1 s_2} [x_2, x_1]^{m_2 s_1}\} \\ &= \{[x_1, x_2]^{m_1 s_2 - m_2 s_1}\} = \{[x_1, x_2]\}^{m_1 s_2 - m_2 s_1}. \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} [g_1, g_2^\varphi]^q &= [x_1^{m_1} x_2^{m_2} [x_1, x_2]^{l_{12}}, (x_1^{s_1} x_2^{s_2} [x_1, x_2]^{t_{12}})^\varphi]^q \\ &= [x_1^{m_1} x_2^{m_2}, (x_1^{s_1} x_2^{s_2} [x_1, x_2]^{t_{12}})^\varphi]^q [[x_1, x_2]^{l_{12}}, (x_1^{s_1} x_2^{s_2})^\varphi]^q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [x_1^{m_1} x_2^{m_2}, (x_1^{s_1} x_2^{s_2})^\varphi]^q [x_1^{m_1} x_2^{m_2}, ([x_1, x_2]^{t_{12}})^\varphi]^q [[x_1, x_2]^{l_{12}}, (x_1^{s_1} x_2^{s_2})^\varphi]^q \\
&= [x_1^{m_1} x_2^{m_2}, (x_1^{s_1} x_2^{s_2})^\varphi]^q [x_1^{m_1} x_2^{m_2}, [x_1, x_2]^\varphi]^{t_{12}q} [[x_1, x_2], (x_1^{s_1} x_2^{s_2})^\varphi]^{l_{12}q}
\end{aligned}$$

pelo Lema 1.4.

Mas pela Proposição 1.10,

$$\begin{aligned}
&[x_1^{m_1} x_2^{m_2}, [x_1, x_2]^\varphi]^q = [x_1, x_2^\varphi]^{-(x_1^{m_1} x_2^{m_2})q} [x_1, x_2^\varphi]^q = \\
&= ([x_1, x_2^\varphi]^q)^{-(x_1^{m_1} x_2^{m_2})} [x_1, x_2^\varphi]^q \\
&= \\
&= \{[x_1, x_2]\}^{-(x_1^{m_1} x_2^{m_2})} \{[x_1, x_2]\}
\end{aligned}$$

pela hipótese, pois x_1 e x_2 são geradores de G . E por R_1 , a última expressão é igual a,

$$= \{[x_1, x_2]^{(x_1^{m_1} x_2^{m_2})}\}^{-1} \{[x_1, x_2]\} = \{[x_1, x_2]\}^{-1} \{[x_1, x_2]\} = 1.$$

Portanto,

$$[x_1^{m_1} x_2^{m_2}, [x_1, x_2]^\varphi]^q = 1. \quad (5.1)$$

Analogamente $[[x_1, x_2], (x_1^{s_1} x_2^{s_2})^\varphi]^q = 1$.

Fazendo cálculos análogos aos feitos para chegar em (5.1), segue que:

$$\begin{aligned}
&[g_1, g_2^\varphi]^q = [x_1^{m_1} x_2^{m_2}, (x_1^{s_1} x_2^{s_2})^\varphi]^q \\
&= [x_1^{m_1}, (x_1^{s_1} x_2^{s_2})^\varphi]^{x_2^{m_2}q} [x_2^{m_2}, (x_1^{s_1} x_2^{s_2})^\varphi]^q \\
&= [x_1^{m_1} [x_1, x_2]^{m_1 m_2}, (x_1^{s_1} x_2^{s_2} [x_1^{s_1} x_2^{s_2}, x_2^{m_2}])^\varphi]^q \\
&= [x_2^{m_2}, (x_2^{s_2})^\varphi]^q [x_2^{m_2}, ((x_1^{s_1})^{x_2^{s_2}})^\varphi]^q = \\
&= [x_1^{m_1}, (x_1^{s_1} x_2^{s_2})^\varphi]^q [x_2, x_2^\varphi]^{m_2 s_2 q} [x_2^{m_2}, (x_1^{s_1})^\varphi] =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [x_1^{m_1}, (x_2^{s_2})^\varphi]^q [x_1^{m_1}, (x_1^{s_1})^\varphi]^{x_2^{s_2}q} \{[x_2, x_2]\}^{m_2 s_2} [x_2^{m_2}, (x_1^{s_1})^\varphi] \\
&= [x_1, x_2^\varphi]^{m_1 s_2 q} [x_1, [x_2, x_1]^\varphi]^{m_1 \binom{s_2}{2} q} [x_1, [x_1, x_2]^\varphi]^{m_1 s_2 q} \\
&\quad \cdot [x_2, x_1^\varphi]^{m_2 s_1 q} [x_2, [x_1, x_2]^\varphi]^{q m_2 \binom{s_1}{2}} [x_2, [x_2, x_1]^\varphi]^{q \binom{m_2}{2} s_1} \\
&= [x_1, x_2^\varphi]^{m_1 s_2 q} [x_2, x_1^\varphi]^{m_2 s_1 q} \\
&= \{[x_1, x_2]\}^{m_1 s_2} \{[x_2, x_1]\}^{m_2 s_1} \\
&= \{[x_1, x_2]\}^{m_1 s_2} \{[x_1, x_2]^{-1}\}^{m_2 s_1} \\
&= \{[x_1, x_2]\}^{m_1 s_2 - m_2 s_1}.
\end{aligned}$$

Logo,

$$[g_1, g_2]^q = \{[g_1, g_2]\}.$$

Agora suponhamos que R_6 seja válida para quaisquer $g_1, g_2 \in H$, onde H é $(n-1)$ -gerado e nilpotente de classe dois. E suponhamos que G seja n -gerado.

Sejam $g_1, g_2 \in G$,

$$\begin{aligned}
g_1 &= \prod_{i=1}^n x_i^{m_i} \prod_{1 \leq j < k \leq n} [x_j, x_k]^{l_{jk}} \\
g_2 &= \prod_{i=1}^n x_i^{s_i} \prod_{1 \leq j < k \leq n} [x_j, x_k]^{t_{jk}}
\end{aligned}$$

onde $m_i, l_{jk}, s_i, t_{jk} \in \mathbb{Z}$.

Podemos escrever g_1 e g_2 da seguinte maneira:

$$g_1 = h_1 u_1, \quad g_2 = h_2 u_2, \tag{5.2}$$

onde,

$$h_1 = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{m_i} \prod_{1 \leq j < k \leq n-1} [x_j, x_k]^{l_{jk}},$$

$$u_1 = x_n^{m_n} [x_{n-1}, x_n]^{l_{(n-1)n}},$$

$$h_2 = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{s_i} \prod_{1 \leq j < k \leq n-1} [x_j, x_k]^{t_{jk}}$$

$$u_2 = x_n^{s_n} [x_{n-1}, x_n]^{t_{(n-1)n}}.$$

Temos que h_1, h_2 pertencem ao grupo $(n-1)$ -gerado $H = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$, e pela hipótese de indução: $[h_1, h_2]^\varphi = \{[h_1, h_2]\}$.

Também temos que u_1, u_2 pertencem ao grupo 2-gerado $U = \langle x_{n-1}, x_n \rangle$. Conseqüentemente, $[u_1, u_2]^\varphi = \{[u_1, u_2]\}$.

Portanto,

$$\begin{aligned} [g_1, g_2]^\varphi &= [h_1 u_1, (h_2 u_2)^\varphi]^\varphi = [h_1, (h_2 u_2)^\varphi]^{u_1 \varphi} [u_1, (h_2 u_2)^\varphi]^\varphi \\ &= [h_1, u_2^\varphi]^{u_1 \varphi} [h_1, h_2^\varphi]^{u_2 u_1 \varphi} [u_1, u_2^\varphi]^\varphi [u_1, h_2^\varphi]^{u_2 \varphi} \\ &= [h_1, u_2^\varphi]^{u_1 \varphi} \{[h_1, h_2]\}^{u_2 u_1} \{[u_1, u_2]\} [u_1, h_2^\varphi]^{u_2 \varphi} \\ &= [h_1, u_2^\varphi]^{u_1 \varphi} \{[h_1, h_2]\} \{[u_1, u_2]\} [u_1, h_2^\varphi]^{u_2 \varphi}. \end{aligned}$$

Mas,

$$\begin{aligned} [h_1, u_2]^\varphi &= [h_1, (x_n^{s_n} [x_{n-1}, x_n]^{t_{(n-1)n}})^\varphi]^\varphi \\ &= [h_1, ([x_{n-1}, x_n]^{t_{(n-1)n}})^\varphi]^\varphi [h_1, (x_n^{s_n})^\varphi]^\varphi \\ &= [h_1, (x_n^{s_n})^\varphi]^\varphi \end{aligned} \tag{5.3}$$

de maneira análoga ao caso (5.1).

Agora podemos escrever h_1 da seguinte maneira:

$$h_1 = v_1 w_1,$$

onde,

$$v_1 = \prod_{i=1}^{n-2} x_i^{m_i} \prod_{1 \leq j < k \leq n-2} [x_j, x_k]^{l_{jk}},$$

$$w_1 = x_{n-1}^{m_{n-1}} [x_{n-2}, x_{n-1}]^{l_{(n-2)(n-1)}}.$$

E assim, por (5.3),

$$[h_1, u_2^\varphi]^q = [v_1 w_1, (x_n^{s_n})^\varphi]^q = [v_1, (x_n^{s_n})^\varphi]^{q w_1} [w_1, (x_n^{s_n})^\varphi]^q.$$

Mas $v_1, x_n^{s_n}$ são elementos do grupo $(n-1)$ -gerado $\langle x_1, \dots, x_{n-2}, x_n \rangle$ e $w_1, x_n^{s_n}$ são elementos do grupo $(n-1)$ -gerado $\langle x_2, \dots, x_n \rangle$. Portanto, podemos usar a hipótese de indução nos dois casos, ou seja,

$$[h_1, u_2^\varphi]^q = \{[v_1, x_n^{s_n}]\} \{[w_1, x_n^{s_n}]\} = \{[h_1, x_n^{s_n}]\}$$

pois $f([v_1, x_n^{s_n}], [w_1, x_n^{s_n}]) \in [G', (G')^\varphi] = 1$,

$$= \{[h_1, x_n^{s_n}][h_1, [x_{n-1}, x_n]]^{t_{(n-1)n}}\}$$

pois $[h_1, [x_{n-1}, x_n]] = 1$ ($G' \subset Z(G)$). Com isso chegamos á igualdade:

$$[h_1, u_2^\varphi]^q = \{[h_1, x_n^{s_n} [x_{n-1}, x_n]^{t_{(n-1)n}}]\} = \{[h_1, u_2]\}.$$

Analogamente, se reescrevermos h_2 da seguinte maneira $h_2 = v_2 w_2$, onde,

$$v_2 = \prod_{i=1}^{n-2} x_i^{s_i} \prod_{1 \leq j < k \leq n-2} [x_j, x_k]^{t_{jk}}$$

$$w_2 = x_{n-1}^{s_{n-1}} [x_{n-2}, x_{n-1}]^{t_{(n-2)(n-1)}}$$

obtendo,

$$[u_1, h_2^\varphi]^q = \{[u_1, h_2]\}.$$

Finalmente, segue que:

$$\begin{aligned}
[g_1, g_2^\varphi]^q &= \{[h_1, u_2]\}^{u_1} \{[h_1, h_2]\} \{[u_1, u_2]\} \{[u_1, h_2]\}^{u_2} \\
&= \{[h_1, u_2]\} \{[h_1, h_2]\} \{[u_1, u_2]\} \{[u_1, h_2]\} \\
&= \{[h_1, u_2 h_2]\} \{[u_1, u_2 h_2]\} = \{[h_1 u_1, u_2 h_2]\} = \{[g_1, g_2]\}.
\end{aligned}$$

Portanto,

$$[g_1, g_2^\varphi] = \{[g_1, g_2]\}, \quad \forall g_1, g_2 \in G.$$

$$(vi) \quad R_5 : \{[k], [k']\} = [k^q, (k'^q)^\varphi]$$

Agora, como R_6 é válida segue o seguinte resultado necessário à demonstração deste caso.

Proposição 5.25 *K age trivialmente sobre $[G, G^\varphi]$.*

Demonstração: Sejam $g_1, g_2 \in G$ e $\{k\} \in K$, então,

$$\begin{aligned}
[g_1, g_2^\varphi]^{\{k\}} &= [g_1, g_2^\varphi]^{k^q} = [g_1^{k^q}, (g_2^{k^q})^\varphi] \\
&= [g_1[g_1, k^q], (g_2[g_2, k^q])^\varphi] = \\
&= [g_1, g_2^\varphi][g_1, ([g_2, k^q])^\varphi][[g_1, k^q], ([g_2, k^q])^\varphi][[g_1, k^q], g_2] \\
&= [g_1, g_2^\varphi].
\end{aligned}$$

Basta usarmos o Lema 1.4, a relação R_6 e a Proposição 1.10. □

Agora, usaremos indução sobre n .

Primeiro suponhamos que $n = 2$, ou seja $G = \langle x_1, x_2 \rangle$, e consideremos $g_1, g_2 \in G$. Então, $k = x_1^{m_1} x_2^{m_2} [[x_1, x_2]^{l_{12}}]$, $k' = x_1^{s_1} x_2^{s_2} [[x_1, x_2]^{t_{12}}]$ onde $m_1, m_2, l_{12}, s_1, s_2, t_{12} \in \mathbb{Z}$.

Então,

$$\begin{aligned} [\{k\}, \{k'\}] &= [\{x_1^{m_1} x_2^{m_2} [x_1, x_2]^{l_{12}}, \{x_1^{s_1} x_2^{s_2} [x_1, x_2]^{t_{12}}\}] \\ &= [\{x_1^{m_1} x_2^{m_2}\} f(x_1^{m_1} x_2^{m_2}, [x_1, x_2]^{l_{12}}) \{[x_1, x_2]^{l_{12}}\}, \\ &\quad \{x_1^{s_1} x_2^{s_2}\} f(x_1^{s_1} x_2^{s_2}, [x_1, x_2]^{t_{12}}) \{[x_1, x_2]^{t_{12}}\}] \end{aligned}$$

Sejam,

$$x' = [x_1, x_2], \quad t_1 = f(x_1^{m_1} x_2^{m_2}, [x_1, x_2]^{l_{12}}), \quad t_2 = f(x_1^{s_1} x_2^{s_2}, [x_1, x_2]^{t_{12}})$$

Pelo Lema 5.7, temos que $\{x'^m\} = \{x'\}^m, \forall m \in \mathbb{Z}$.

Segue que:

$$\begin{aligned} [\{k\}, \{k'\}] &= [\{x_1^{m_1} x_2^{m_2}\} t_1 \{x'^{l_{12}}\}, \{x_1^{s_1} x_2^{s_2}\} t_2 \{x'^{t_{12}}\}] \\ &= [\{x_1^{m_1} x_2^{m_2}\} t_1 \{x'\}^{l_{12}}, \{x_1^{s_1} x_2^{s_2}\} t_2 \{x'\}^{t_{12}}] \\ &= [\{x_1^{m_1} x_2^{m_2}\}, \{x'\}^{t_{12}}]^{t_1 \{x'\}^{l_{12}}} [\{x_1^{m_1} x_2^{m_2}\}, t_2] \{x'\}^{t_{12} t_1 \{x'\}^{l_{12}}} \\ &= [\{x_1^{m_1} x_2^{m_2}\}, \{x_1^{s_1} x_2^{s_2}\}]^{t_2 \{x'\}^{t_{12} t_1 \{x'\}^{l_{12}}}} [t_1, \{x'\}^{t_{12}}] \{x'\}^{l_{12}} [t_1, t_2] \{x'\}^{t_{12} + l_{12}} \\ &= [t_1, \{x_1^{s_1} x_2^{s_2}\}]^{t_2 \{x'\}^{t_{12} + l_{12}}} [\{x'\}^{l_{12}}, \{x'\}^{t_{12}}] \\ &= [\{x'\}^{l_{12}}, t_2] \{x'\}^{l_{12}} [\{x'\}^{l_{12}}, \{x_1^{s_1} x_2^{s_2}\}]^{t_2 \{x'\}^{t_{12}}}. \end{aligned} \tag{5.4}$$

Agora temos os seguintes resultados:

$$[t_1, t_2] = 1, \quad [\{x'\}^{l_{12}}, \{x'\}^{t_{12}}] = 1. \tag{5.5}$$

Pela Proposição 5.25, segue que,

$$[\{x_1^{m_1} x_2^{m_2}\}, t_2] = 1, \quad [t_1, \{x'\}^{t_{12}}] = 1 \tag{5.6}$$

e

$$[t_1, \{x_1^{s_1} x_2^{s_2}\}] = 1, [\{x'\}^{l_{12}}, t_2] = 1. \quad (5.7)$$

Também temos que,

$$[\{x_1^{m_1} x_2^{m_2}\}, \{x'\}^{t_{12}}] = 1. \quad (5.8)$$

E,

$$[\{x_1^{m_1} x_2^{m_2}\}, \{x_1^{s_1} x_2^{s_2}\}] = [\{x_1\}^{m_1} \{x_2\}^{m_2}, \{x_1\}^{s_1} \{x_2\}^{s_2}]. \quad (5.9)$$

Voltando em (5.4), e usando (5.5), (5.6), (5.7), (5.8), (5.9), obtemos:

$$\begin{aligned} [\{k\}, \{k'\}] &= [\{x_1^{m_1} x_2^{m_2}\}, \{x_1^{s_1} x_2^{s_2}\}] = [\{x_1\}^{m_1} \{x_2\}^{m_2}, \{x_1\}^{s_1} \{x_2\}^{s_2}] \\ &= [\{x_1\}^{m_1}, \{x_2\}^{s_2}]^{\{x_2\}^{m_2}} [\{x_1\}^{m_1}, \{x_1\}^{s_1}]^{\{x_2\}^{s_2+m_2}} \\ &= [\{x_2\}^{m_2}, \{x_2\}^{s_2}] [\{x_2\}^{m_2}, \{x_1\}^{s_1}]. \end{aligned}$$

Mas temos que,

$$\{x_1\}^{m_1 \{x_2\}^{m_2}} = \{x_1\}^{m_1} [x_1^q, (x_2^q)^\varphi]^{m_1 m_2}.$$

Logo,

$$[\{x_1\}^{m_1}, \{x_2\}^{s_2}] = \{x_1\}^{-m_1} \{x_1\}^{m_1 \{x_2\}^{s_2}} = [x_1^q, (x_2^q)^\varphi]^{m_1 s_2} = [\{x_1\}, \{x_2\}]^{m_1 s_2}.$$

Portanto,

$$[\{k\}, \{k'\}] = [\{x_1\}, \{x_2\}]^{m_1 s_2 - m_2 s_1}. \quad (5.10)$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} [k^q, (k'^q)^\varphi] &= [(x_1^{m_1} x_2^{m_2} [x_1, x_2]^{l_{12}})^q, ((x_1^{s_1} x_2^{s_2} [x_1, x_2]^{t_{12}})^q)^\varphi] \\ &= [(x_1^{m_1} x_2^{m_2})^q x'^{l_{12}q}, (((x_1^{s_1} x_2^{s_2})^q x'^{t_{12}q})^\varphi)] \\ &= [(x_1^{m_1} x_2^{m_2})^q, ((x_1^{s_1} x_2^{s_2})^q)^\varphi] [(x_1^{m_1} x_2^{m_2})^q, (x'^{t_{12}q})^\varphi] [x'^{l_{12}q}, ((x_1^{s_1} x_2^{s_2})^q x'^{t_{12}q})^\varphi] \end{aligned}$$

$$= [(x_1^{m_1} x_2^{m_2})^q, ((x_1^{s_1} x_2^{s_2})^q)^\varphi]$$

pela Proposição 1.10, e pela relação R_6 ,

$$\begin{aligned} &= [x_1^{m_1 q} x_2^{m_2 q} [x_2, x_1]^{m_1 m_2 q}, (x_1^{s_1 q} x_2^{s_2 q} [x_2, x_1]^{s_1 s_2 q})^\varphi] \\ &= [x_1^q, (x_2^q)^\varphi]^{m_1 s_2} [x_2^q, (x_1^q)^\varphi]^{m_2 s_1} \\ &= [\{x_1\}, \{x_2\}]^{m_1 s_2} [\{x_2\}, \{x_1\}]^{m_2 s_1} = [\{x_1\}, \{x_2\}]^{m_1 s_2 - m_2 s_1}. \end{aligned} \quad (5.11)$$

Portanto, por (5.10) e (5.11), segue que:

$$[\{k\}, \{k'\}] = [k^q, (k'^q)^\varphi].$$

Agora suponhamos que R_5 seja válida para todo grupo $(n-1)$ -gerado, e consideremos $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Sejam $k, k' \in G$, onde,

$$k = \prod_{i=1}^n x_i^{m_i} \prod_{1 \leq j < k \leq n} [x_j, x_k]^{l_{jk}}$$

$$\prod_{i=1}^n x_i^{s_i} \prod_{1 \leq j < k \leq n} [x_j, x_k]^{t_{jk}}.$$

Como em (5.2) podemos reescrever k, k' da seguinte maneira:

$$k = h_1 u_1, \quad k' = h_2 u_2.$$

Daí,

$$\{k\} = \{h_1\} f(h_1, u_1) \{u_1\}, \quad \{k'\} = \{h_2\} f(h_2, u_2) \{u_2\},$$

onde $h_1, h_2 \in H = \langle x_1, \dots, x_{n-1} \rangle$ e $u_1, u_2 \in S = \langle x_{n-1}, x_n \rangle$.

Portanto,

$$\begin{aligned} [\{k\}, \{k'\}] &= [\{h_1\} f(h_1, u_1) \{u_1\}, \{h_2\} f(h_2, u_2) \{u_2\}] \\ &= [\{h_1\}, \{u_2\}]^{f(h_1, u_1) \{u_1\}} [\{h_1\}, f(h_2, u_2)]^{\{u_2\} f(h_1, u_1) \{u_1\}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& [\{h_1\}, \{h_2\}]^{f(h_2, u_2)\{u_2\}f(h_1, u_1)\{u_1\}} \\
& [f(h_1, u_1), \{u_2\}]^{\{u_1\}} [f(h_1, u_1), f(h_2, u_2)]^{\{u_2\}\{u_1\}} \\
& [f(h_1, u_1), \{h_2\}]^{f(h_2, u_2)\{u_2\}\{u_1\}} \\
& [\{u_1\}, \{u_2\}][\{u_1\}, f(h_2, u_2)]^{\{u_2\}}[\{u_1\}, \{h_2\}]^{f(h_2, u_2)\{u_2\}}. \quad (5.12)
\end{aligned}$$

Temos que h_1 pode ser reescrito da seguinte maneira $h_1 = v_1 w_1$, como em (5.4), onde $v_1 \in \langle x_1, \dots, x_{n-2} \rangle$ e $w_2 \in \langle x_{n-2}, x_{n-1} \rangle$.

Assim,

$$\begin{aligned}
& [\{h_1\}, \{u_2\}] = [\{v_1\}f(v_1, w_1)\{w_1\}, \{u_2\}] \\
& = [\{v_1\}, \{u_2\}]^{f(v_1, w_1)\{w_1\}} [f(v_1, w_1), \{u_2\}]^{\{w_1\}} [\{w_1\}, \{u_2\}] \\
& = [v_1^q, ((x_n^{s_n})^q)^\varphi] [w_1^q, (u_2^q)^\varphi]
\end{aligned}$$

pela Proposição 1.10, e pelo fato de que v_1 e $x_n^{s_n}$ pertencem ao grupo $(n-1)$ -gerado $\langle x_1, \dots, x_{n-2}, x_n \rangle$, podendo assim usarmos a hipótese de indução.

Também temos os seguintes resultados:

$$\begin{aligned}
& [\{h_1\}, f(h_2, u_2)] = 1 \\
& [\{h_1\}, \{h_2\}] = [h_1^q, (h_2^q)^\varphi] \quad (5.13)
\end{aligned}$$

pois $h_1, h_2 \in \langle x_1, \dots, x_{n-1} \rangle$ e podemos usar a hipótese de indução.

$$\begin{aligned}
& [f(h_1, u_1), \{u_2\}] = 1 \\
& [f(h_1, u_1), f(h_2, u_2)] = 1 \\
& [\{u_1\}, \{u_2\}] = [u_1^q, (u_2^q)^\varphi]
\end{aligned}$$

pois $u_1, u_2 \in \langle x_{n-1}, x_n \rangle$, e podemos usar o primeiro passo de indução.

Portanto, segue de (5.12) que,

$$\begin{aligned}
[\{k\}, \{k'\}] &= [v_1^q, ((x_n^{s_n})^q)^\varphi][w_1^q, (u_2^q)^\varphi][h_1^q, (h_2^q)^\varphi][u_1^q, (u_2^q)^\varphi] \\
&= [h_1^q, (u_2^q)^\varphi][u_1^q, (h_2^q)^\varphi][h_1^q, (h_2^q)^\varphi][u_1^q, (u_2^q)^\varphi].
\end{aligned} \tag{5.14}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned}
[k^q, (k'^q)^\varphi] &= [(h_1 u_1)^q, ((h_2 u_2)^q)^\varphi] \\
&= [h_1^q u_1^q [u_1, h_1]^{(q)}, (h_2^q u_2^q [u_2, h_2]^{(q)})] \\
&= [h_1^q, (u_2^q)^\varphi][h_1^q, (h_2^q)^\varphi][u_1^q, (u_2^q)^\varphi][u_1^q, (h_2^q)^\varphi].
\end{aligned} \tag{5.15}$$

Finalmente, de (5.14) e (5.15), segue que,

$$[\{k\}, \{k'\}] = [k^q, (k'^q)^\varphi]. \tag{5.16}$$

□

Então com o Teorema 5.14 obtemos uma apresentação simplificada de $\nu^q(G)$, $\delta^q(G) = \langle G, G^\varphi, \mathcal{K} | S'_1, S'_2, R'_1, R'_2, R'_3, R_4, R'_5, R'_6 \rangle$, e em $\delta^q(G)$ basta considerarmos que as relações $S_1, S_2, R_1, R_2, R_3, R_5, R_6$ são válidas nos geradores de G e de G^φ . Mas isto não se estende à relação R_4 , e portanto temos ainda um número grande de relações no grupo $\delta^q(G)$: $4n^2 + 3n^3 + (|G| - 1)^2$.

Referências Bibliográficas

- [1] Bacon, M.R., *On the Non-abelian Tensor Square of a Nilpotent Group of Class Two*, Glasgow Math. J., **36**, No.3, (1994) 291-296.
- [2] Brown, R., *q-perfect Groups and Universal q-central Extensions*, Publ. Mat., **34**, (1990) 291-297.
- [3] Brown, R. and Loday, J.-L., *Van Kampen Theorems for Diagrams of Spaces*, Topology, **26**, (1987) 311-335.
- [4] Brown, R., Johnson, D.L., Robertson, E.F., *Some Computations of Non-abelian Tensor Product of Groups*, J. Algebra, **111**, No.1, (1987) 177-202.
- [5] Conduché, D., Rodríguez-Fernandez, C., *Non-abelian Tensor and Exterior Products modulo q and Universal q-central Relative Extensions*, J. Pure Appl. Algebra, **78**, No.2, (1992) 139-160.
- [6] Ellis, G., *Tensor Product and q-crossed Modules*, J. London Math. Soc., **2(51)**, No.2, (1995) 243-258.
- [7] Ellis, G., *The Non-abelian Tensor Product of Finite Groups is Finite*, J. Algebra, **111**, No.1, (1987) 203-205.
- [8] Ellis, G. and Leonard, F., *Computing Schur Multipliers and Tensor Products of Finite Groups*, Proc. Royal Irish Ac., **95A**, No.2, (1995) 137-147.
- [9] The Gap Group, GAP—Groups, Algorithms, and Programming, Version 4.4, 2005 (<http://www.gap-system.org>).
- [10] Hilton, P., Stammbach, U., *A Course in Homological Algebra*, Springer-Verlag, 1970.

- [11] Johnson, D.L., *Presentations of Groups*, London Math. Soc., Student Texts 15, Second Edition, 1997.
- [12] Kappe, L.C., *Nonabelian Tensor Products of Groups: the Commutator Connection*, Proc. Groups - St.Andrews 1997 at Bath LMS Lecture Notes.
- [13] Magnus, W., Karrass, A., and Solitar, D., *Combinatorial Group Theory: Presentations of Groups in Terms of Generators and Relations*, Second Edition, Dover Publications, New York, 1976.
- [14] McDermott, A., *The Nonabelian Tensor Product of Groups: Computations and Structural Results*, PhD Thesis, Nat. Univ. Ireland, Galloway, April 1998.
- [15] Miller, C., *The Second Homology Group of a Group; Relations Among Commutators*, Proc. Amer. Math. Soc. **3**, (1952) 588-595.
- [16] Nakaoka, I.N., *Sobre o Produto Tensorial não Abelião de Grupos Solúveis*, Tese de Doutorado, UNICAMP, Campinas, 1998.
- [17] Nakaoka, I.N., *Sobre o Produto Tensorial não Abelião de Grupos*, Dissertação de Mestrado, UNICAMP, Campinas, 1994.
- [18] Nakaoka, I.N. and Rocco, N.R., *Nilpotent Actions on Non-Abelian Tensor Products of Groups*, Matemática Contemporânea, SBM, **21**, (2001) 223-238.
- [19] Robinson, D.J.S., *A Course in the Theory of Groups*, Second Edition, Springer
- [20] Rocco, N.R., *A Presentation for a Crossed Embedding of Finite Solvable Groups*, Communications in Algebra, **22(6)**, (1994) 1975-1998.
- [21] Rocco, N.R., *On a Construction Related to the Non-Abelian Tensor Square of a Group*, Bol. Soc. Bras. Mat., **22**, No.1, (1991) 63-79.
- [22] Rocco, N.R., *Métodos de Lie em Teoria dos Grupos*, Atas da 9ª Escola de Álgebra, Coleção Atas da SBM, No.17, Brasília, (1987).
- [23] Rotman, J.J., *An Introduction to Homological Algebra*, Academic Press, New York, 1979.
- [24] Rotman, J.J., *An Introduction to the Theory of Groups*, Fourth Edition, Springer, 1999.

Livros Grátis

(<http://www.livrosgratis.com.br>)

Milhares de Livros para Download:

[Baixar livros de Administração](#)

[Baixar livros de Agronomia](#)

[Baixar livros de Arquitetura](#)

[Baixar livros de Artes](#)

[Baixar livros de Astronomia](#)

[Baixar livros de Biologia Geral](#)

[Baixar livros de Ciência da Computação](#)

[Baixar livros de Ciência da Informação](#)

[Baixar livros de Ciência Política](#)

[Baixar livros de Ciências da Saúde](#)

[Baixar livros de Comunicação](#)

[Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE](#)

[Baixar livros de Defesa civil](#)

[Baixar livros de Direito](#)

[Baixar livros de Direitos humanos](#)

[Baixar livros de Economia](#)

[Baixar livros de Economia Doméstica](#)

[Baixar livros de Educação](#)

[Baixar livros de Educação - Trânsito](#)

[Baixar livros de Educação Física](#)

[Baixar livros de Engenharia Aeroespacial](#)

[Baixar livros de Farmácia](#)

[Baixar livros de Filosofia](#)

[Baixar livros de Física](#)

[Baixar livros de Geociências](#)

[Baixar livros de Geografia](#)

[Baixar livros de História](#)

[Baixar livros de Línguas](#)

[Baixar livros de Literatura](#)
[Baixar livros de Literatura de Cordel](#)
[Baixar livros de Literatura Infantil](#)
[Baixar livros de Matemática](#)
[Baixar livros de Medicina](#)
[Baixar livros de Medicina Veterinária](#)
[Baixar livros de Meio Ambiente](#)
[Baixar livros de Meteorologia](#)
[Baixar Monografias e TCC](#)
[Baixar livros Multidisciplinar](#)
[Baixar livros de Música](#)
[Baixar livros de Psicologia](#)
[Baixar livros de Química](#)
[Baixar livros de Saúde Coletiva](#)
[Baixar livros de Serviço Social](#)
[Baixar livros de Sociologia](#)
[Baixar livros de Teologia](#)
[Baixar livros de Trabalho](#)
[Baixar livros de Turismo](#)