

Notícia aos Leitores: Recomendações ACIP para Evitar a Gestação Após a Recepção de Vacina Contendo o Componente Rubéola

Em 18 de outubro de 2001, o Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunizações (ACIP) revisou os dados de várias fontes indicando que nenhum caso de síndrome da rubéola congênita (SRC) foi identificado entre crianças nascidas de mulheres que foram vacinadas inadvertidamente contra rubéola nos primeiros 3 meses de gestação. Com base nesses dados, o ACIP encurtou o período recomendado para evitar a gestação após ter recebido vacina com o componente rubéola de 3 meses para 28 dias.

Os dados foram disponibilizados do Registro de Vacina contra Rubéola na Gestação dos Estados Unidos (*J*), do Programa Nacional de Vigilância da Rubéola Congênita do Reino Unido (Bioestatística Nacional de Vigilância do Registro de Congêntas, dados não publicados, 2001; P. Tookeu, PhD., Centro de Epidemiologia Pediátrica e Bioestatística, Instituto de Saúde Infantil, Londres, comunicação pessoal, abril de 2001), e Suíça e Alemanha (G. Enders, M.D., Laboratório de Enders e Parceiros, e Instituto de Virologia, Infectologia, e Epidemiologia, comunicação pessoal, setembro de 2001) sobre 680 nascidos vivos de mulheres suscetíveis que foram vacinadas inadvertidamente 3 meses antes ou durante a gestação com uma das três vacinas contra rubéola (HPV-77, Cendehill, ou RA 27/3). Nenhuma das crianças nasceu com SRC. Entretanto, um pequeno risco teórico de 0,5% (limite de confiança de 95% - 0,05%) não pode ser descartado. Limitando a análise às 293 crianças nascidas de mães suscetíveis vacinadas 1-2 semanas antes a 4-6 semanas após a concepção, o risco máximo teórico é 1,3%. Este risco é substancialmente menor que o risco $\geq 20\%$ para SRC associado com infecção materna durante as primeiras 20 semanas de gestação.

A vacina contra sarampo-caxumba-rubéola (MMR) e seu componente vacinal não devem ser administrados a mulheres que desconheçam estar gestante. Devido que o risco para o feto da administração dessas vacinas de vírus vivo não é possível de exclusão por razões teóricas, as mulheres devem ser orientadas a evitarem a gestação por 28 dias após a vacinação com vacinas contra o sarampo ou caxumba ou MMR ou outras vacinas contendo o componente sarampo.

A meta do programa de vacinação contra rubéola nos Estados Unidos é prevenir a infecção congênita da rubéola . O ACIP recomendou que a vacina MMR deve ser oferecida para todas as mulheres em idade fértil (ou sejam, adolescentes e mulheres em pré menopausa) que não tiverem evidência aceitável de imunidade para rubéola.

Livros Grátis

<http://www.livrosgratis.com.br>

Milhares de livros grátis para download.

A maioria dos casos de rubéola nos Estados Unidos ocorre entre hispânicos adultos jovens nascidos fora dos Estados Unidos (2), e a maioria das crianças com SRC nasce de mães nascidas em outros países. A garantia da imunidade em mulheres em idade fértil, especialmente aquelas sob risco altíssimo para exposição, auxiliarão na prevenção da SRC.

Referências

1. CDC. Measles, mumps, and rubella - vaccine use and strategies for elimination of measles, rubella, and congenital rubella syndrome and control of mumps: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 1998;47(no. RR-8).
2. Reef SE, Frey TK, Abernathy E, et al. The changing epidemiology of rubella in the 1990s: on the verge of elimination and new challenges for control and prevention. JAMA(in press).

O uso de nomes de marcas e fontes comerciais é para identificação apenas e não implica no endosso pelo Departamento de Saúde e Serviço Social dos Estados Unidos.

As referências aos sites não CDC na Internet são fornecidos como um serviço aos leitores MMWR e não constituem ou implicam no endosso dessas organizações ou seus programas pelo CDC ou o Departamento de Saúde e Serviço Social dos Estados Unidos. O CDC não se responsabiliza pelo conteúdo das páginas encontradas nesses sites.

Este documento traduzido trata-se de uma contribuição da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações – CGPNI/CENEPI/FUNASA/MS, a todos que se dedicam às ações de imunizações.

Livros Grátis

(<http://www.livrosgratis.com.br>)

Milhares de Livros para Download:

[Baixar livros de Administração](#)

[Baixar livros de Agronomia](#)

[Baixar livros de Arquitetura](#)

[Baixar livros de Artes](#)

[Baixar livros de Astronomia](#)

[Baixar livros de Biologia Geral](#)

[Baixar livros de Ciência da Computação](#)

[Baixar livros de Ciência da Informação](#)

[Baixar livros de Ciência Política](#)

[Baixar livros de Ciências da Saúde](#)

[Baixar livros de Comunicação](#)

[Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE](#)

[Baixar livros de Defesa civil](#)

[Baixar livros de Direito](#)

[Baixar livros de Direitos humanos](#)

[Baixar livros de Economia](#)

[Baixar livros de Economia Doméstica](#)

[Baixar livros de Educação](#)

[Baixar livros de Educação - Trânsito](#)

[Baixar livros de Educação Física](#)

[Baixar livros de Engenharia Aeroespacial](#)

[Baixar livros de Farmácia](#)

[Baixar livros de Filosofia](#)

[Baixar livros de Física](#)

[Baixar livros de Geociências](#)

[Baixar livros de Geografia](#)

[Baixar livros de História](#)

[Baixar livros de Línguas](#)

[Baixar livros de Literatura](#)
[Baixar livros de Literatura de Cordel](#)
[Baixar livros de Literatura Infantil](#)
[Baixar livros de Matemática](#)
[Baixar livros de Medicina](#)
[Baixar livros de Medicina Veterinária](#)
[Baixar livros de Meio Ambiente](#)
[Baixar livros de Meteorologia](#)
[Baixar Monografias e TCC](#)
[Baixar livros Multidisciplinar](#)
[Baixar livros de Música](#)
[Baixar livros de Psicologia](#)
[Baixar livros de Química](#)
[Baixar livros de Saúde Coletiva](#)
[Baixar livros de Serviço Social](#)
[Baixar livros de Sociologia](#)
[Baixar livros de Teologia](#)
[Baixar livros de Trabalho](#)
[Baixar livros de Turismo](#)